


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 462

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste
 Período: 15/04/2009 a 22/04/2009

MONITORAMENTO: As chuvas que foram acumuladas nesta última semana ficaram entre 40 e 70 milímetros no centro, centro-leste e oeste do Mato Grosso, além do norte e nordeste de Goiás. No restante da Região Centro-Oeste, a precipitação acumulada não ultrapassou os 25 milímetros. A estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 25 dias em toda a região. A umidade do solo encontra-se entre 15 e 30 milímetros no centro e sul os Pantanais (MS), assim como o sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas regionais, as reservas de água do solo encontram-se entre 45 e 75 milímetros. Segundo o portal Agrolink, a redução dos estoques finais da safra total de soja publicada no último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (Usda) teve reflexo imediato nos preços da commodity no mercado internacional. Bom para Mato Grosso, que na reta final de colheita comemora a possibilidade de fazer uma melhor comercialização da sua safra.



PREVISÃO: Nos próximos sete dias, a precipitação acumulada deve ficar entre 60 e 100 milímetros no noroeste e centro-norte do Mato Grosso. Nas demais áreas da Região Centro-Oeste, os acumulados de chuva devem ficar abaixo dos 40 milímetros. Em toda a região, as temperaturas máximas devem variar de 27°C a 33°C e as mínimas de 16°C a 21°C. Os tratamentos fitossanitários são necessários no sul e sudeste do Mato Grosso do Sul, e ainda nos Pantanais (MS). Pode-se irrigar apenas a maior parte do Mato Grosso do Sul, exceto o extremo norte. Não se deve praticar o manejo do solo no centro e centro-norte de Goiás. Distrito Federal, sudoeste do Mato Grosso, microrregiões mato-grossenses de Colíder e Alta Floresta, sul dos Pantanais (MS), centro-sul e sul do Mato Grosso do Sul. A colheita só encontra-se em situação desfavorável no município e cidades vizinhas de Apiacás (MT). O uso de defensivos agrícolas não deve ser utilizado na microrregião goiana de Meia Ponte, centro de Goiás, município e cidades vizinhas de Apiacás (MT), além do centro-norte e nordeste do Mato Grosso do Sul.



CANOLA DE SEQUEIRO
CEVADA IRRIGADA
TRIGO DE SEQUEIRO
TRIGO IRRIGADO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura