




Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sul




Boletim Número: 463

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
 Período: 17/04/2009 a 24/04/2009

MONITORAMENTO: Pouca chuva em toda a Região Sul, registrando acumulados entre 20 e 40 milímetros no nordeste do Paraná, sendo que nas demais localidades os valores ficaram abaixo de 10 milímetros. No centro-norte e oeste do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, nordeste, centro-oeste e centro-leste do Paraná, a estiagem agrícola encontra-se entre 35 e 55 dias. No restante da região, a estiagem agrícola varia de 5 a 30 dias. A umidade do solo encontra-se entre 45 e 65 milímetros no sul da Área Serrana (SC), Grande Florianópolis (SC), centro-oriental do Rio Grande do Sul, Área Metropolitana de Curitiba (PR) e Norte Pioneiro paranaense. Nas demais áreas da região, a umidade do solo encontra-se entre 5 e 30 milímetros. O zoneamento de risco climático para a cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul (safra 2008/2009) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (17). A portaria 54 relaciona os municípios contemplados e o período mais adequado ao plantio das cultivares aprovado pelo estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O zoneamento agrícola, realizado pelo Departamento de Gestão de Risco Rural, da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, objetiva minimizar os riscos de ocorrência de adversidades climáticas coincidentes com as fases mais sensíveis das culturas. A indicação da melhor época de plantio resulta de análise de séries climáticas históricas, de no mínimo 15 anos, correlacionadas ao ciclo dos cultivares e ao tipo de solo, conforme sua retenção de água.



PREVISÃO: Nesta próxima semana, os acumulados de chuva devem ficar entre 35 e 50 no centro da Área Serrana (SC), Grande Florianópolis (SC) e Área Metropolitana de Curitiba (PR). No restante da Região Sul, a precipitação acumulada deve ficar entre 5 e 25 milímetros. No centro-norte e nordeste gaúcho, Área Serrana (SC), noroeste de Santa Catarina, Grande Florianópolis (SC) e sudeste do Paraná, as temperaturas máximas devem ficar entre 19°C e 23°C. No restante regional, as máximas devem ficar entre 25°C e 29°C. Já as mínimas, devem variar de 8°C a 13°C na maior parte da região, exceto a faixa litorânea que deve ficar entre 15°C e 19°C. Os tratamentos fitossanitários são aconselháveis no noroeste do Rio Grande do Sul, todo o estado do Paraná e na maior parte de Santa Catarina (exceto o sul e Grande Florianópolis). As irrigações não são necessárias somente no sudeste do Rio Grande do Sul e Grande Florianópolis. Não se deve praticar o manejo do solo no noroeste e extremo sul de Santa Catarina, Vale do Itajaí (SC), maior parte do Paraná (exceto Área Metropolitana de Curitiba e Norte Pioneiro), além do centro-oeste, nordeste e norte da Área Metropolitana de Porto Alegre. As condições são favoráveis para a colheita em todo o sul do país. Já o uso de defensivos agrícola é desfavorável apenas no centro-norte do Rio Grande do Sul.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

CAFE ARABICA DE SEQUEIRO
CANOLA DE SEQUEIRO
TRIGO DE SEQUEIRO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura