

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sul


Boletim Número: 465

Boletim Agrometeorológico da Região Sul
Período: 24/04/2009 a 01/05/2009

Monitoramento: Nesta última semana foi registrado acúmulos de precipitação entre 90 e 100 milímetros no extremo-sul do Paraná e região metropolitana de Florianópolis. Nas demais áreas da Região Sul, os acumulados variaram entre cinco e 30 milímetros, exceto no centro-norte e oeste do Paraná e no sudoeste gaúcho onde não ocorreram acúmulos de chuva. Mesmo assim, a colheita das frutas de kiwi na região da Serra gaúcha está acelerada, em decorrência de longos períodos de temperaturas altas e com algumas quedas bruscas, além da deficiência de umidade. Essa situação determinou a antecipação da safra. A maçã, beneficiada pelo clima, também tem a colheita acelerada no Rio Grande do Sul. As frutas vêm se mantendo com excelente aspecto, coloração e sabor. A umidade no solo registrada no norte e oeste do Paraná não ultrapassa 15 milímetros, enquanto nas demais áreas as reservas hídricas do solo atingem até 40 milímetros. Assim, no Paraná, os produtores que tiveram prejuízos por conta da estiagem nos meses de novembro e dezembro do ano passado, durante a safra de verão, começam a se preocupar com a falta de chuva na região e a fazer cálculos de possíveis perdas na lavoura de milho safrinha. Alguns acreditam já ter perdido cerca de 40% das lavouras de feijão no município de Araruna. Já em Engenheiro Beltrão (PR), por causa da seca, colheu-se em média 1,7 mil quilos por hectare de soja, enquanto a produção de milho ficou em 6,2 mil quilos. A estiagem agrícola na Região atinge 60 dias em algumas localidades do norte e oeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul. Com: Gazeta do Povo e Agrolink.



Previsão: A temperatura máxima prevista, entre 28 e 29°C, deverá ser registrada no oeste e norte do Paraná e centro do Rio Grande do Sul. Já a mínima, deverá variar entre 7 e 8°C nas serras gaúchas e catarinenses. A condição para os tratamentos fitossanitários é favorável no oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, assim como em grande parte do Paraná, exceto noroeste e sudeste deste estado. Não há necessidade de irrigação no extremo-nordeste do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina (exceto região de Lagunas e Curitibanos) e no extremo-sul e sudeste do Paraná. O manejo do solo apresenta condição favorável nas proximidades de Quitandinha (PR), faixa entre campo Alegre e São Joaquim (SC) e região de Quinze de Novembro (RS) e Jaquirana (RS). Nas demais áreas do Paraná, centro-oeste e litoral catarinense e noroeste e sudeste do Rio Grande do Sul, a condição para este manejo é desfavorável. Nas demais áreas da Região o manejo do solo é razoável. A colheita apresenta-se razoável na maior parte da Região Sul do País, exceto região de São Bernardino (SC), Pitangueiras (PR), Caçapava do Sul (RS) e Pirapó (RS), onde a condição é favorável.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

CAFE ARABICA DE SEQUEIRO
 CANA DE ACUCAR ZON OUTROS FINS
 CANOLA DE SEQUEIRO
 TRIGO DE SEQUEIRO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
 Embrapa Informática Agropecuária
 Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura