

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste

Boletim Número: 470


Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste
Período: 20/05/2009 a 27/05/2009

MONITORAMENTO: Na última semana os maiores acumulados foram registrados no nordeste do Mato Grosso do Sul (região de Águas Claras e Três Lagoas), centro e oeste do Mato Grosso (região de Comodoro e Diamantino) além do centro-oeste de Goiás (nos municípios vizinhos a Aruanã). Essas localidades registram entre 70 e 110 milímetros. As demais áreas da região variaram entre 20 e 60 milímetros. Poucos pontos isolados no sul de Goiás e noroeste do Mato Grosso do Sul não registraram precipitação. As reservas hídricas do solo seguem acima de 50 milímetros no norte e extremo-sul de Goiás, norte e leste do Mato Grosso do Sul, além de grande parte do Mato Grosso (exceção feita ao centro e sudeste do Estado e região de Aripuanã). As demais áreas da região registram pouca quantidade de água no solo, entre 20 e 35 milímetros, valores normais para essa época do ano. A estiagem agrícola não ultrapassa 30 dias em praticamente toda a região. As condições climáticas que vêm acontecendo desde de fevereiro no Mato Grosso vêm beneficiando a cultura do girassol, e os produtores de Campo Novo do Parecis estão otimistas com a safra. As lavouras estão bonitas e, para aumentar a lucratividade, eles começam a investir no beneficiamento da semente. O girassol vem sendo usado na região na rotação de culturas com soja. O plantio da soja é feito em setembro e outubro, e o do girassol em fevereiro, para colher em junho/julho. O girassol é uma planta de origem europeia, que se adaptou muito bem ao cerrado. Na região, sua adaptação favoreceu diversos produtores uma vez que, comparativamente a outras culturas, tolera mais a falta de chuva durante seu ciclo. Na previsão da Conab a cultura de girassol deve registrar um crescimento de 5% nesta safra. A estimativa é que o Brasil colha 157 mil toneladas de semente. Mato Grosso lidera o ranking com 53,2% da produção. (Com: Globo Rural).



PREVISÃO: Os maiores acumulados devem acontecer no oeste do Mato Grosso, onde, ao longo da semana, deve ser registrado entre 35 e 55 milímetros. O sul do Mato Grosso do Sul e centro de Goiás, deve variar entre 15 e 30 milímetros. Grande parte de Goiás e noroeste do Mato Grosso não devem registrar precipitação. As demais áreas variam não ultrapassa 20 milímetros de acúmulo. Na próxima semana, a temperatura máxima pode variar entre 32 e 34°C no sul do Mato Grosso e centro de Goiás. Já em Mato Grosso do Sul, as máximas não ultrapassam 31°C, que deve ser registrada no noroeste do Estado. As mínimas devem variar entre 12 e 15°C no leste de Goiás e leste do Mato Grosso do Sul. As demais áreas da região variam entre 18 e 22°C. Nas próximas 48 horas, a colheita segue favorável e razoável em toda a região. No mesmo período, a aplicação de defensivos agrícolas é desfavorável no nordeste do Mato Grosso, sul e sudeste do Mato Grosso do Sul, leste de Goiás e região de Gama no Distrito Federal. As demais áreas seguem em condição razoável. Os tratamentos fitossanitários seguem em condição desfavorável no Mato Grosso; oeste e centro-sul do Mato Grosso do Sul; centro e oeste do Distrito Federal; e leste de Goiás. As demais áreas apresentam condições favoráveis para esses tratamentos. Nos próximos dois dias há necessidade de irrigação no sul de Goiás; sudeste do Distrito Federal; centro-oeste e sul do Mato Grosso do Sul, além das seguintes regiões do Mato Grosso: Novo Mundo, Tapurah, Campo Novo do Parecis e norte de Aripuanã. As demais áreas não necessitam de irrigação. O manejo do solo segue desfavorável no oeste do Mato Grosso do Sul,

região de Gama no Distrito Federal, além de alguns municípios no centro-norte e oeste do Mato Grosso. Em Goiás, os municípios em condição desfavorável são: Rio Verde, Jataí, Bom Jesus de Goiás e região, Aruanã, Britânia e municípios vizinhos. As demais áreas seguem em condição razoável e favorável para o manejo.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

CEVADA IRRIGADA
MANDIOCA
TRIGO IRRIGADO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura