


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 475

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste
Período: 27/05/2009 a 03/06/2009

MONITORAMENTO: Registro de precipitação acumulada abaixo de 15 milímetros em toda a Região Centro-oeste, nesta última semana. Também em toda a região, a estiagem agrícola varia de 15 a 40 dias. Já a umidade do solo, encontra-se entre 10 e 30 milímetros nos Pantanais (MS), centro do Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás e centro-norte do Mato Grosso. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho do MT (Aprosoja), o produtor é o que mais tem sofrido nas últimas safras com a volatilidade do dólar porque tem dificuldade de repassar o aumento dos custos para o preço do produto, já que a soja, por exemplo, tem preços formado em Chicago (EUA) e reflete a lei da oferta e da procura. O dólar baixo prejudica, principalmente, aqueles que estão localizados em regiões mais distantes dos portos de escoamento, como os do Centro-Oeste do país. "O real é a moeda que forma o valor do transporte no Brasil. Quando este custo é convertido para dólar nas baixas cotações, o valor fica mais alto", explica o analista Marcelo Vital.



PREVISÃO: As temperaturas máximas devem ficar entre 23°C e 27°C no leste e sudoeste de Goiás, centro e sul do Mato Grosso do Sul, além dos Pantanais (MS). Nas demais localidades da região, as máximas devem variar de 28°C a 32°C. Entretanto, as mínimas devem ficar entre 13°C e 17°C em todo o estado de Goiás, sendo que nas demais áreas regionais, devem variar de 18°C a 22°C. Não há necessidade de tratamentos fitossanitários em toda a porção do Mato Grosso do Sul, sudoeste, centro-oeste e sudeste do Mato Grosso. Há necessidade de irrigação no sul e centro-norte do Mato Grosso do Sul, norte dos Pantanais (MS), noroeste, centro-sul e sudoeste de Goiás, além do centro-leste, centro-oeste e nordeste do Mato Grosso. Não deve se praticar o manejo do solo apenas no centro-sul de Goiás. A colheita é favorável no centro-sul do Mato Grosso do Sul. Não deve se utilizar defensivos agrícolas somente nos Pantanais (MS) e centro-sul do Mato Grosso do Sul.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura