


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Nordeste


Boletim Número: 483

Boletim Agrometeorológico da Região Nordeste
 Período: 16/06/2009 a 23/06/2009

MONITORAMENTO: Na última semana os maiores acumulados ficaram restritos ao noroeste do Maranhão e leste de Alagoas. Essas localidades registraram entre 90 e 140 milímetros de acumulo. Já o norte do Maranhão e do Piauí, centro-norte do Ceará e Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, grande parte de Alagoas, norte de Sergipe e leste da Bahia, registraram, em média, 30 milímetros. As demais áreas, não registraram precipitação. As reservas hídricas do solo seguem elevadas em toda a faixa norte e leste da região. A porcentagem de água disponível no solo nessa região, varia entre 60 e 75 milímetros. Por outro lado, o interior da Bahia e sudeste do Piauí, tem baixa quantidade de água no solo e registram, em média, 25 milímetros. As demais áreas variam entre 40 e 55 milímetros. A estiagem agrícola não ultrapassa 50 dias na região. A chuva atrapalhou a colheita da soja no sul do Piauí. O escoamento da safra também ficou comprometido por causa da condição das estradas. Ainda por causa do excesso de chuva nos meses de abril e maio, grande parte dos terrenos está encharcada e as máquinas não conseguem se movimentar. Uma parte da soja de uma área da região foi colhida, mas depois a lavoura teve de ser abandonada. Os produtores que conseguiram colher mais de 90% da safra reclamam da qualidade do produto e da dificuldade para vender a soja. Mas a mesma chuva que fez estragos na soja beneficiou a safra do milho. A colheita começou há 15 dias. (Com: Globo Rural).



PREVISÃO: Na próxima semana, as temperaturas máximas podem variar entre 32 e 34° C no interior do Piauí, norte do Maranhão e oeste do Rio Grande do Norte. As mínimas variam entre 15 e 18°C no interior da Bahia e oeste de Pernambuco. A precipitação acumulada deve ficar restrita ao norte e leste da região e não devem ultrapassar 30 milímetros. O norte do Maranhão e leste da Bahia, devem registrar os maiores acúmulos: entre 20 e 36 milímetros. As demais áreas não devem registrar precipitação. Nas próximas 48 horas a colheita segue razoável em praticamente toda a região, exceção feita ao Maranhão, extremo-norte do Ceará e uma pequena área no centro da Bahia, próximo a Entre-Rios, que seguem em condição desfavorável para colher. A aplicação de defensivos agrícolas é desfavorável em grande parte de Alagoas, nordeste da Bahia, norte e centro-sul do Ceará, norte do Maranhão, grande parte da Paraíba e de Pernambuco, além do centro-sul do Rio Grande do Norte. As demais áreas seguem em condição razoável. No mesmo período, os tratamentos fitossanitários seguem favorável no centro e oeste da Bahia, centro-sul do Maranhão, oeste da Paraíba, sul do Piauí e região de Água Nova, sudoeste do Rio Grande do Norte. As demais áreas seguem em condição desfavorável. Não há necessidade de irrigação em grande parte da região nas próximas 48 horas, exceção feita ao interior da Bahia, sul do Ceará, região de Mirador (Maranhão) e sul de Sergipe. O manejo do solo segue razoável e favorável em praticamente toda a região, exceção feita ao oeste de Pernambuco, norte do Maranhão e pequenas áreas no interior baiano.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMENDOIM
BANANA DE SEQUEIRO
BANANA IRRIGADA
BANANA IRRIGADA ZONEAMENTO
CAJU
COCO DE SEQUEIRO
DENDE DE SEQUEIRO
FEIJAO CAUPI
FEDAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
GIRASSOL DE SEQUEIRO C
MANDIOCA
MILHO DE SEQUEIRO
SORGO ZON GRAO E SEMENTES
UVA AMERICANA IRRIGADA
UVA EUROPEIA IRRIGADA



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura