


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 484

Boletim Agrometeorológico da Região Centro-Oeste
 Período: 17/06/2009 a 24/06/2009

MONITORAMENTO: Nesta última semana, os registros de precipitação acumulada ficaram entre 40 e 55 milímetros no centro-oeste do Mato Grosso do Sul e sul dos Pantanais (MS). No restante da Região Centro-Oeste, os acumulados de chuva ficaram abaixo dos 20 milímetros. A estiagem agrícola encontra-se abaixo dos 20 dias no centro de Goiás, sul do Mato Grosso do Sul, centro e sul dos Pantanais (MS), além do norte do Mato Grosso. Nas demais áreas da região, a estiagem varia de 30 a 60 dias. Em toda a região, a umidade do solo encontra-se entre 20 e 45 milímetros. Segundo o Diário de Cuiabá, o Mato Grosso liderou a lista dos compradores de fertilizantes no período: foram adquiridas 1,3 milhão de toneladas nos cinco primeiros meses do ano. O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) aponta que os produtores do Estado já compraram cerca de 80% da demanda total de insumos prevista para a safra 09/10. O número contrasta com os dados da Anda. Apesar do grande volume adquirido pelos produtores, a comercialização ainda é muito inferior à demanda média do Estado, que é de cerca de 4 milhões de toneladas por ano.



PREVISÃO: Nesta próxima semana, as temperaturas máximas devem ficar entre 22 e 26 graus no leste e sul de Goiás, além do leste e sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais localidades da Região Centro-Oeste, as máximas devem variar de 28 a 32 graus. Nas próximas 48 horas, não são aconselháveis tratamentos fitossanitários no centro e centro-norte de Goiás, assim como o centro-leste e oeste do Mato Grosso. O manejo do solo pode ser realizado no sudoeste, centro, noroeste e nordeste de Goiás, além do nordeste, centro-norte, centro-sul e sudeste do Mato Grosso, e ainda, o centro e leste do Mato Grosso do Sul. A colheita pode ser feita em toda a região centro-oeste do país, assim como o uso de defensivos agrícolas.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura