

# Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


## Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

### Estações Meteorológicas de Região Nordeste

Boletim Número: 485


BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO DA REGIÃO NORDESTE  
Período: 30/06/2009 a 07/07/2009

**MONITORAMENTO:** Na última semana os maiores acumulados ficaram no extremo-norte do Maranhão e do Ceará, além do extremo-leste do Rio Grande do Norte e Paraíba. Essas localidades registraram, em média, 110 milímetros de acúmulo. Já as demais localidades do norte da região, centro do Piauí, e a parte leste da região, registraram entre 20 e 60 milímetros. As demais áreas não registraram precipitação. A umidade do solo segue elevada no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, leste de Pernambuco, extremo-leste de Alagoas e centro-leste baiano. Essas localidades registram entre 55 e 75 milímetros. As demais áreas registram baixas reservas hídricas, entre 20 e 45 milímetros. A estiagem agrícola não ultrapassa 50 dias na região mantendo elevada a umidade do solo em algumas regiões. Agricultores da zona rural de Teresina, que tiveram prejuízos com a enchente, estão recebendo sementes para um novo plantio. Eles querem aproveitar a umidade das áreas de vazante para recuperar parte das perdas. Segundo os técnicos da região, agora, é hora de plantar novamente. Como o último período chuvoso foi intenso, na região será possível colher feijão e milho até o final do ano. A área que foi alagada se transformou em terra fértil. A umidade do solo é o que vai garantir o crescimento da planta, sem depender de chuvas. É a chamada agricultura de vazante. A distribuição das sementes vai até o fim de junho. Cada família receberá da prefeitura cinco quilos de feijão e três quilos de milho. Na margem do Rio Parnaíba. Sessenta famílias já iniciaram o plantio com as sementes que receberam do governo. Segundo a Emater, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí, cinquenta e cinco toneladas de sementes de arroz, feijão e milho já foram distribuídas aos agricultores do Estado. São sementes para o plantio de vazante. (Com: Globo Rural)



**PREVISÃO:** Na próxima semana as temperaturas máximas podem variar entre 33 e 34.5°C no norte do Maranhão e centro do Piauí. O interior da Bahia não deve ultrapassar 29°C de máximas. As temperaturas mínimas podem variar entre 16 e 18°C na maior parte da Bahia, Pernambuco e sul do Piauí. As demais localidades variam entre 20 e 23°C, podendo chegar a 25°C no norte do Maranhão, Piauí e Ceará. Nas próximas 48 horas a colheita segue em condição razoável na maior parte da região, exceção feita ao leste de Pernambuco (região de Recife) e à região de Juazeiro, na Bahia. No mesmo período, a aplicação de defensivos agrícolas é desfavorável e crítica em grande parte do Maranhão (exceção feita ao centro do estado), sul do Rio Grande do Norte (região de Caicó), grande parte da Paraíba, centro-leste de Pernambuco, centro e leste de Alagoas, centro-sul de Sergipe, e algumas localidades do centro e leste da Bahia. As demais áreas seguem em condição razoável para a aplicação. Os tratamentos fitossanitários seguem desfavorável na maior parte da região. Algumas localidades como o oeste e sul da Bahia, norte de Sergipe, oeste do Ceará e grande parte do Piauí, no entanto, seguem em condição favorável para essas aplicações. Nos próximos dois dias há necessidade de irrigação no sul do Maranhão, Piauí, sul do Ceará, sul da Paraíba, centro-oeste de Pernambuco, grande parte de Alagoas, Sergipe e Bahia. As demais áreas não necessitam ser irrigadas. O manejo do solo segue favorável e razoável no centro-norte do maranhão, norte do Piauí, praticamente todo Ceará (exceção feita ao extremo-sul), Rio Grande do Norte (exceção feita ao extremo-sudoeste), centro da Paraíba, leste de Pernambuco (exceção feita a região de Recife), Alagoas, Sergipe (exceção

feita ao extremo-sul) e as regiões centro, oeste e sul da Bahia. As demais áreas seguem em condição desfavorável e crítica para manejar o solo.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

BANANA DE SEQUEIRO  
BANANA IRRIGADA  
BANANA IRRIGADA ZONEAMENTO  
CAJU  
DENDE DE SEQUEIRO  
FEDAO CAUPI  
MANDIOCA  
UVA AMERICANA IRRIGADA  
UVA EUROPEIA IRRIGADA



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados  
Embrapa Informática Agropecuária  
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura