


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Centro-Oeste


Boletim Número: 489

Boletim Agrometeorológico da região Centro-Oeste
 Período: 15/07/2009 a 22/07/2009

MONITORAMENTO: Na última semana os acumulados de precipitação se concentraram no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso. Essas localidades, no entanto, não ultrapassaram os 40 milímetros de acúmulo. As demais áreas da região não registraram precipitação. Com a chuva ocorrida, as reservas hídricas do solo se elevaram no centro-sul Mato Grosso do Sul, que registra entre 55 e 70 milímetros. As demais áreas da região seguem com baixa disponibilidade de água no solo e registram, em média, 20 milímetros. A estiagem agrícola segue elevada no norte da região e, muitas localidades no norte do Mato Grosso e norte de Goiás chegam a registrar até 80 dias sem chuvas regulares acima de 10 milímetros. Já o sul da região não ultrapassa 20 dias, exceção feita a uma pequena área no noroeste do Mato Grosso do Sul, que varia entre 40 e 60 dias. Dias mais secos facilitaram a colheita do algodão no Mato Grosso e do milho em Goiás, que ocupada uma área 10% maior do que a do ano passado. As condições climáticas durante a safra favoreceram a cultura do milho, fazendo dessa colheita dentro do esperado pelos produtores. A saca de milho está saindo por R\$ 16,50 em Rio Verde. (com Globo Rural)



PREVISÃO: A próxima semana deve ser de pouquíssimas chuvas para a região, que deve ficar restrita ao sul do Mato Grosso do Sul, com menos de 10 milímetros de acúmulo. Para as demais áreas da região, não há previsão de chuva. As temperaturas máximas variam entre 32°C e 34°C no centro-norte do Mato Grosso e as mínimas variam entre 12°C e 14°C no nordeste de Goiás, região do Distrito Federal. Nas próximas 48 horas a colheita segue razoável/favorável na região. A aplicação de defensivos agrícolas segue razoável em grande parte da região, exceção feita ao nordeste e sul do Mato Grosso do Sul, centro-norte de Goiás (e a região de Mineiros), além do oeste do Mato Grosso. Os tratamentos fitossanitários seguem desfavorável em grande parte do Mato Grosso do Sul e Goiás (exceção feita a região oeste). Já em Mato Grosso, apenas o leste do estado e a região de Mundo Novo seguem desfavoráveis. No mesmo período há necessidade de irrigação em praticamente toda a região, exceção feita ao sul do Mato Grosso do Sul. O manejo do solo segue desfavorável em grande parte da região exceção feita ao sul do Mato Grosso do Sul, que segue favorável.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura