




Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sudeste




Boletim Número: 495

BOLETIM AGROMETEOROLÓGICO REGIÃO SUDESTE
 Período: 13/08/2009 a 20/08/2009

MONITORAMENTO: Na última semana grande parte da região sudeste não registrou precipitação, exceção feita ao leste de São Paulo, sul e extremo-norte do Rio de Janeiro e nordeste do Espírito Santo. Essas localidades registraram menos de dez milímetros de acúmulo ao longo da semana. Assim, a estiagem agrícola segue elevada em toda a região, condição essa que é normal para essa época do ano. Em média, a região registra 50 dias sem chuvas regulares acima de dez milímetros. As reservas hídricas do solo seguem baixas em Minas Gerais, norte de São Paulo, norte do Rio de Janeiro e grande parte do Espírito Santo. Essas localidades registram entre 5 e 20 milímetros de água disponível no solo. Por outro lado, o centro-sul e leste de São Paulo, além do sul do Rio de Janeiro, variam entre 45 e 65 milímetros. Produtores de milho de Minas Gerais começam a planejar o plantio da safra de verão. A queda no preço do grão preocupa e muitos já pensam em reduzir a área. Muitos agricultores venderam apenas parte da safra para poder pagar as dívidas, pois o preço não está compensando. Mesmo a diminuição de mais de 20% no custo da produção para a nova safra não anima os produtores. O baixo preço do milho no mercado é um fator que pesa na hora de decidir o tamanho da área que o cereal vai ocupar. Já em São Paulo, uma nova fruta vem ganhando espaço nos pomares: A Atemoia. As condições climáticas dos últimos meses ajudaram no desenvolvimento da fruta, que está no pico da produção, e, este ano, deve ter safra recorde. A região sudoeste paulista é uma das principais produtoras do Brasil. A safra começa em abril e só termina em setembro. Em Pilar do Sul, são cerca de 25 produtores e uma área de mais de 150 hectares plantados. Como a maioria dos pomares ainda está em formação, todos os anos a produção vem aumentando. Em 2009, a previsão é de safra recorde, com duas mil toneladas. Cada atemoia é vendida por um preço que varia de dois a três reais. (Com: Globo Rural).



PREVISÃO: Na próxima semana as temperaturas máximas podem chegar a 30°C no oeste de São Paulo e oeste do Triângulo Mineiro. Por outro lado, no sudoeste de Minas Gerais, divisa com São Paulo, as máximas não ultrapassam 25°C. As mínimas podem ficar entre 10 e 13°C no centro de Minas Gerais e nordeste de São Paulo. Nas próximas 48 horas a colheita segue em condição razoável em toda a região. No mesmo período, a aplicação de defensivos agrícolas é desfavorável no noroeste e sudeste do Espírito Santo, norte de Minas Gerais (região do Jequitinhonha e Miravania), norte do Rio de Janeiro e extremo oeste de São Paulo (região de Andradina). As demais localidades seguem em condição razoável. No mesmo período de dois dias, os tratamentos fitossanitários seguem favorável em grande parte de São Paulo (exceção feita ao extremo-oeste), oeste do Rio de Janeiro, centro-sul de Minas Gerais. As demais áreas seguem em condição desfavorável. Há necessidade de irrigação em toda a região, exceção feita ao centro-sul de São Paulo, centro de Espírito Santo e região de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O manejo do solo segue desfavorável e crítico em Minas Gerais, norte de São Paulo (além da região de Campinas, Araçatuba e Dracena), centro-norte do Rio de Janeiro, e grande parte do Espírito Santo (exceção feita ao centro do Estado). As demais áreas seguem em condição razoável e favorável.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMEXA
FEDAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
MANDIOCA
UVA AMERICANA
UVA AMERICANA IRRIGADA
UVA EUROPEIA
UVA EUROPEIA IRRIGADA



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura