

# Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


## Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

### Estações Meteorológicas de Região Norte


Boletim Número: 505

Boletim Agrometeorológico da Região Norte  
Período: 31/08/2009 a 07/09/2009

**MONITORAMENTO:** Na última semana, as precipitações acumuladas abrangeram grande parte da Região Norte e registraram entre 5 e 20 milímetros de acúmulo. Apenas o centro-sul do estado do Pará e quase todo o estado do Tocantins não apresentaram acúmulo de precipitação. As reservas hídricas do solo estiveram abaixo dos 20 mm em toda a região, exceção feita aos estados de Roraima e a porção noroeste do estado do Amazonas, que registram em média, 35 a 50 milímetros. Somente na divisa do estado do Acre com o estado do Amazonas que a água disponível no solo ultrapassou os 60 mm. Devido à ausência de precipitação acumulada, a estiagem agrícola foi mais evidente no estado do Tocantins, onde variou de 80 a 95 dias. Nos estados do Amazonas e Pará ela oscilou entre 45 e 65 dias, e nos estados do Amapá e de Rondônia ela não ultrapassou 15 dias.



**PREVISÃO:** Na próxima semana não há previsão de precipitação para o estado do Tocantins e na parte sudeste do estado do Pará. Somente no extremo oeste dos estados do Acre e do Amazonas que podem acumular entre 24 a 44 mm de precipitação. As temperaturas máximas variam entre 33°C e 35° em grande parte da Região. Já nos estados do Tocantins, do Pará e leste do Amazonas, devem oscilar entre 35° e 37°C. As mínimas podem variar entre 21 e 24°C em toda região. Nas próximas 48 horas, a colheita segue razoável na região. A aplicação de defensivos agrícolas segue em condição razoável para quase toda a região. As exceções ficam com o estado do Pará, nas regiões de Oriximiná, Ariapú e Carajás, onde as condições são desfavoráveis; e no extremo-sul de Rondônia, que apresenta condições críticas. Apresentam condições favoráveis para tratamentos fitossanitários os estados de Rondônia, Roraima, centro-sul do Pará, extremo-leste e sul do Amapá, sul do Acre e na região de Parintins no estado do Amazonas. Nos próximos dois dias há necessidade de irrigação no extremo-oeste do Acre, grande parte do Amapá, de Rondônia e do Pará. O manejo do solo é desfavorável a crítico nas regiões de Tapauá e Envira no estado do Amazonas; de Manuel Urbano e Rio Branco no estado Acre; no estado do Amapá, Roraima, Rondônia. Somente o estado de Roraima segue em condição razoável e favorável para o manejo.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

MAMONA  
MILHO DE SEQUEIRO  
SOJA DE SEQUEIRO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados  
Embrapa Informática Agropecuária  
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura