

3**CUIDADOS SANITÁRIOS
NA CRIAÇÃO DOS BEZERROS**

Antonio Cândido Cerqueira Leite Ribeiro
Fernando Procópio Scartatelli
Embrapa Gado de Leite

- 1. Colostro** - Fazer o bezerro ingerir ou mamar o colostro imediatamente após o nascimento, isto porque o bezerro nasce sem proteção contra as infecções e o colostro possui substâncias (anticorpos) que vão protegê-lo. Quanto maior a quantidade de colostro consumido, maior a proteção e menor a taxa de mortalidade.
- 2. Umbigo** - Fazer o corte e a cura do umbigo, durante três a quatro dias, mergulhando-o em um vidro pequeno, porém de boca larga, com solução de álcool iodado a 6%.
- 3. Diarréias** - Para evitar diarréias nos bezerros, é importante que eles permaneçam em ambientes adequados, secos, com água e comida de boa qualidade. Nos locais que permanentemente estejam com umidade elevada, com poças de água ou mesmo com barro, onde os bezerros bebam água, a possibilidade de contaminação aumenta. As diarréias mais comuns aparecem na forma de curso branco, negro, diarréia de sangue etc., provocando nos bezerros desidratação, podendo até levá-los à morte.

TRATAMENTO DAS DIARRÉIAS:

Devem receber soro, de preferência o soro caseiro, principalmente no início da doença. Se a diarréia agravar, usar soro fisiológico ou soro glicosado a 5%, gota a gota, na veia. Em alguns casos, os animais devem ser tratados com antibióticos, para melhor recuperação.

Bezerros com diarréias devem ser isolados dos outros, pois ficam mais fracos e não conseguem competir pela água e comida.

- 4. Pneumonia** - Na criação de bezerros, devem ser evitados locais onde os animais permaneçam e recebam correntes de ar constantes. Isso ocorre com certa freqüência nos bezerreiros de alvenaria feitos com ripas de madeira, nos quais o ar penetra por baixo, provocando ventos frios constantes.

ESCREVA OU TELEFONE PARA O NOSSO PLANTÃO TÉCNICO
ÁREA DE DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS
Rua Eugênio do Nascimento, 610 - Dom Bosco - Juiz de Fora - MG
CEP: 36038-330 - Telefone: (032)249-4700 - Fax: (032)249-4751

Ao fornecer medicamentos pela boca do bezerro, ou principalmente o leite, deve-se ter o cuidado para que o líquido não vá para o pulmão, o que facilitaria o bezerro pegar uma pneumonia. Para evitar que isso ocorra, não deve ser dado de uma só vez, mas aos poucos, em intervalos, deixando que o animal engula compassadamente.

- 5. Tristeza Parasitária** - é uma doença transmitida pelo carrapato, cujos sintomas são: febre, anemia, podendo ainda aparecer urina escura parecida com sangue, respiração ofegante, desidratação e morte.
- 6. Verminose** - "Vermifugar" os bezerros a partir dos quatro meses de idade; em meados de abril, junho e setembro, com dose de reforço em dezembro. Este esquema deve ser feito até os dois anos de idade.

Para informações adicionais, converse com o agente de extensão rural de seu município, o técnico da cooperativa ou da indústria de laticínios, ou consulte nosso Plantão Técnico:

Gado de Leite - Área de Difusão e Transferência de Tecnologias

Rua Eugênio do Nascimento, 610 - Dom Bosco

Juiz de Fora - MG - CEP: 36038-330

Fone: (032) 249-4700 - Fax: (032) 249-4751

CAMPANHA NACIONAL DE AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM REBANHOS LEITEIROS:

AUMENTE A EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE LEITE ENCURTANDO

O INTERVALO ENTRE PARTOS DE SUAS VACAS.

PARTICIPE DOS NOSSOS LEILÕES DE GADO DE LEITE

Escreva-nos manifestando o seu interesse em ser convidado, na ocasião,
e receber informações detalhadas a respeito

- Vacas, novilhas e tourinhos Holandês P.O. ⇨ mês de junho, em Coronel Pacheco (MG)