

5

DESMAME PRECOCE

Fernando Procópio Scarlatelli
Embrapa Gado de Leite

OBJETIVO: DESMAMAR O BEZERRO COM 60 DIAS DE IDADE

Normalmente, o período de amamentação do bezerro tem uma duração de seis a dez meses, quando então a vaca "seca" naturalmente, ocorrendo a desmama. Nessas condições, quantidades acentuadas de leite são gastas na alimentação dos bezerros.

O desmame precoce, como o próprio nome indica, consiste em cortar o leite do bezerro, quando este atinge a idade de 60 dias, ou seja, dois meses de vida. Esta prática pode acarretar diminuição no custo de alimentação do bezerro, além de propiciar maior disponibilidade de leite para venda. Sabe-se que o leite é um alimento nobre, e caro, quando utilizado como único alimento para os bezerros; por essa razão, a sua alimentação deve ser feita por um período indispensável e curto.

Para se ter sucesso no desmame precoce, torna-se necessário fazer com que o bezerro seja levado, o mais cedo possível, a ingerir alimentos sólidos, tais como concentrados, capim picado ou feno, o que possibilita acelerar o desenvolvimento do rúmen, que passa a digerir os alimentos sólidos, fazendo com que o bezerro deixe de ser dependente do leite.

COMO PROCEDER AO DESMAME PRECOCE

Logo após o nascimento, e durante os três primeiros dias de vida, o bezerro deve ingerir o colostro, mamando na própria mãe ou no balde, quando o aleitamento artificial for o preferido.

A partir do 4º dia, o bezerro inicia a fase de aleitamento propriamente dita. Além do leite que irá receber, o bezerro deverá ter à sua disposição os alimentos sólidos já citados (concentrado, capim picado, ou feno) e também água.

**LEIA OUTRAS PUBLICAÇÕES DA Embrapa Gado de Leite
SOBRE ESTE TEMA E OUTROS A ELE RELACIONADOS**

Quando aleitado artificialmente, o bezerro deverá receber no balde três litros de leite por dia, de uma só vez, podendo ser fornecido pela manhã ou à tarde. Com este intervalo de 24 horas, o bezerro, sentindo fome, ficará estimulado a comer os alimentos sólidos, o que tornará mais seguro o desmame.

Na hipótese de o bezerro mamar na vaca, quer seja na ordenha da manhã ou na da tarde, separá-lo da vaca o mais rápido possível. Quando o bezerro atingir 60 dias de idade, cortar o leite de uma só vez. No caso de aleitamento artificial, não fornecer mais leite. Se o aleitamento for natural, esgotar toda a vaca, não deixando nada para o bezerro mamar. Nos dias subseqüentes, se a vaca não descer o leite, encostar o bezerro ao seu pé, apenas na hora da ordenha, para facilitar a descida do leite. Feito o desmame precoce, o bezerro poderá ir para o pasto. Entretanto, deve-se notar que o bezerro deverá continuar recebendo concentrado até atingir um ano de idade.

ALIMENTOS SÓLIDOS

O sucesso do desmame depende do consumo antecipado de concentrados. O produtor poderá usar o concentrado vendido no comércio com a denominação de "ração inicial". Caso prefira fabricar o seu próprio concentrado, o produtor deve ter em mente os seguintes pontos: o concentrado deve ser bastante palatável; ter uma textura grosseira (usar o fubá de milho bem grosso); conter alto teor de energia; conter 16% de proteína bruta da matéria seca (deve ser adicionada uma boa mistura mineral).

Quanto ao volumoso, usar pontas de capim picado, ou feno de aveia, alfafa ou outra boa forrageira. Água limpa e de boa origem deve sempre estar à disposição dos animais.

Para informações adicionais, converse com o agente de extensão rural de seu município, o técnico da cooperativa ou da indústria de laticínios, ou consulte nosso Plantão Técnico:

Gado de Leite - Área de Difusão e Transferência de Tecnologias

Rua Eugênio do Nascimento, 610 - Dom Bosco

Juiz de Fora - MG - CEP: 36038-330

Fone: (032) 249-4700 - Fax: (032) 249-4751

CAMPANHA NACIONAL DE AUMENTO DA PRODUTIVIDADE EM REBANHOS LEITEIROS:

AUMENTE A EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE LEITE ENCURTANDO

O INTERVALO ENTRE PARTOS DE SUAS VACAS.