

# 16

## OPÇÕES DE CONCENTRADOS PARA BEZERROS ATÉ OS 360 DIAS DE IDADE

Oriel Fajardo de Campos  
Milton de Souza Dayrell  
Embrapa Gado de Leite

### INTRODUÇÃO

Pode-se considerar a criação de bezerros como sendo o primeiro passo na exploração leiteira e, como em qualquer outra atividade, o sucesso vai depender, pelo menos em parte, de como esse passo será dado.

Um dos principais objetivos dos criadores de bovinos de leite deve ser a redução nos índices de doenças e mortalidade dos bezerros, através da aplicação de práticas adequadas de manejo, higiene e alimentação que permitam também redução no custo de alimentação desses animais.

<b>Ingredientes (%)</b>	01	02	03	04	05	06	07	08
Milho, fubá	45,7	60,5	62,0	34,5	43,5	66,0	52,0	75,0
Soja, farelo	-	-	-	-	13,5	5,0	10,0	22,0
Algodão, farelo	28,0	37,0	14,0	22,5	-	26,0	10,0	-
Trigo, farelo	24,0	-	20,0	40,0	40,0	-	25,0	-
Uréia	-	-	1,5	-	-	-	-	-
Minerais	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Calcário calcítico	1,8	2,0	1,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
PB - Proteína bruta	16,0	16,4	17,8	15,7	16,5	16,1	16,2	17,4
NDT - Energia	71,6	72,6	73,4	70,8	75,2	74,7	74,9	80,6
Ca - Cálcio	0,91	0,99	0,83	1,21	1,06	1,05	1,05	1,05
P - Fósforo	0,67	0,56	0,58	0,75	0,68	0,55	0,63	0,40

### RECOMENDAÇÕES

A partir da segunda semana de idade, colocar o concentrado à disposição dos bezerros. Após o desaleitamento precoce (60 dias), a quantidade é de 1 ou 2 kg de concentrado, por animal por dia, até os seis meses de idade, dependendo da qualidade do alimento volumoso disponível. Dos seis meses até um ano de idade, a quantidade de concentrado é de 1 kg/animal/dia. Deve-se renovar, com frequência, o concentrado no cocho, principalmente nas primeiras semanas de vida dos bezerros. Alimentos molhados e mofados são menos consumidos e podem provocar doenças.

**Embrapa**  
**UMA EMPRESA A SERVIÇO DOS PRODUTORES BRASILEIROS**