


**Projeto - Criação e avaliação
de variedades de citros em
ecossistemas tropicais e
subtropicais, com ênfase
em Tabuleiros Costeiros**

**Laranja
'Valência Tuxpan CNPMF'**

A citricultura brasileira apresenta baixa produtividade e deficiência de suprimento de frutas ao longo do ano devido ao número restrito de cultivares em uso, com amplo predomínio da laranja 'Pêra'. A diversificação de cultivares copa e porta-enxerto é uma meta que a **Embrapa Mandioca e Fruticultura** vem perseguindo de forma enfática. O lançamento da laranjeira 'Valência Tuxpan CNPMF' faz parte de uma estratégia que visa introduzir novas alternativas que permitam ampliar a faixa de colheita dos pomares, favorecendo o processamento de suco em período mais longo e o próprio abastecimento do mercado interno.



Pesquisadores responsáveis:

*Orlando Sampaio Passos
Walter dos Santos Soares Filho*

Colaboradores:

*Djalma Faria de Oliveira Filho
Luiz Jacson Lemos de Carvalho
Citrocultura do Nordeste, Rio Real (BA)*



Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Mandioca e Fruticultura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rua Embrapa, s/n - CP. 007 - 44380-000 - Cruz das Almas - BA
PABX (75) 621-8000 - Fax (75) 621-8097
sac@cnpmf.embrapa.br
<http://www.cnpmf.embrapa.br>

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento



Novembro/2004 - 2000 exemplares

**Laranja
'Valência Tuxpan CNPMF'
- uma opção de laranja
tardia para a citricultura**



Características Botânicas

Planta

Porte alto, altura em torno de 3,5 m, volume da copa de 44 m³ e diâmetro do tronco (a 30 cm do solo) de cerca de 25 cm.

Folha

Típica, tonalidade verde-escuro.

Fruto

Tamanho médio (peso 230 g), conteúdo de suco de aproximadamente 50%, altura média de 7,4 cm e diâmetro médio de 7,5 cm, com cerca de 6 sementes por fruto. Teor de sólidos solúveis totais - SST próximo a 10%, acidez total - AT da ordem de 0,7% e relação SST/AT ao redor de 14. Casca ligeiramente rugosa, amarela uniforme e polpa alaranjada intensa.



Floração

Principal em setembro e outras temporadas, em épocas variáveis.

Maturação

Tardia, colheita de agosto a outubro.

Produtividade

Alta, em torno de 40 t por hectare.

Origem

É um clone nucelar de laranjeira 'Valência', obtido na **Embrapa Mandioca e Fruticultura** a partir de sementes introduzidas de Tuxpan, Estado de Vera Cruz, México.

Material Propagativo

O germoplasma da laranjeira 'Valência Tuxpan CNPMF' pode ser disponibilizado via borbulhas ou mudas.



Larajeiras 'Valência Tuxpan CNPMF' em frutificação ao lado das laranjeiras 'Pêra' colhidas, Faz. Maratá - Rio Real, BA.

Recomendações

A laranja 'Valência Tuxpan CNPMF', de maturação tardia, atende tanto ao mercado interno de fruta fresca como à indústria de processamento de suco.