

## Características da Variedade


A variedade Cabocla foi lançada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical em dezembro de 2002, visando atender demandas dos mercados interno e externo em relação à produção de frutos de acerola para consumo ao natural, bem como para processamento.

Como principais características para diferenciá-la de outras variedades, as plantas apresentam porte globular e flores com pétalas brancas e alta viabilidade de pólen (72%). Os frutos são grandes (até 12 g de peso), firmes, de casca vermelha e polpa alaranjada, com sulcos profundos na parte externa, boa palatabilidade e alta relação polpa/caroço. Apresentam, ainda, alto conteúdo de vitamina C, superior a 1.000 mg de ácido ascórbico por 100 g de polpa.



## Recomendações Técnicas

- A variedade Cabocla é indicada para plantios sob condições de tabuleiros costeiros no espaçamento de 5,0 x 5,0 m;
- Na implantação de um pomar, deve-se utilizar mudas saudáveis, produzidas em substrato isento de nematóides;
- O plantio, em condições de sequeiro, deve ser feito em covas com dimensões de 40 x 40 x 40 cm, no início da estação chuvosa;
- Podas que permitam a condução da copa em forma de vaso aberto promovem a penetração de luz solar no seu interior e o desenvolvimento de frutos em todas as áreas da copa, melhorando a qualidade dos frutos e diminuindo a quebra de ramos e a altura das plantas;



- O plantio intercalado com outras variedades de acerola ('Rubra', 'Sertaneja' e/ou 'Okinawa') favorece a polinização cruzada e a produção de frutos;
- Um suprimento adequado de água e nutrientes ao longo do ano é fundamental para garantir uma alta produção, superior a 40 kg/ano de frutos por planta;

- A adubação deve ser baseada na análise de solo. Pode ser feita na cova, no momento do plantio (calcário, fósforo e adubo orgânico) e, em pomar estabelecido (nitrogênio, fósforo e potássio), na projeção da copa, duas a três vezes ao ano;
- A incidência de pragas (formigas cortadeiras, moscas das frutas, ortézia, percevejo vermelho, pulgão, nematóide das galhas) e doenças (antracnose, podridão de frutos e seca descendente de ramos) deve ser freqüentemente monitorada. Deve-se evitar a utilização de pesticidas nas épocas de floração e frutificação, dando preferência ao controle cultural mediante podas, eliminação de frutos e ramos atacados.
- A colheita deve ser realizada a cada três dias, nas horas mais frescas, evitando-se a coleta de frutos caídos ao solo;
- A comercialização ou processamento dos frutos deve ser imediata para evitar perdas por deterioração.

Rua Embrapa, s/n - Caixa Postal 007  
 44380-000 - Cruz das Almas, BA  
 Telefone: (75) 3312-8048 - Fax: (75) 3312-8096  
[sac@cnpmf.embrapa.br](mailto:sac@cnpmf.embrapa.br)  
[www.cnpmf.embrapa.br](http://www.cnpmf.embrapa.br)

**Embrapa**

*Mandioca e Fruticultura Tropical*

**Ministério da  
 Agricultura, Pecuária  
 e Abastecimento**



Dezembro/2005 - 1000 exemplares  
 Setembro/2009 - 1000 exemplares

# ACEROLA 'CABOCLA'



## Características e Técnicas de Cultivo

**Embrapa**

*Mandioca e Fruticultura Tropical*