

Agritempo

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico


Estações Meteorológicas de Região Norte

Boletim Número: 531


Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 16/11/2009 a 23/11/2009

MONITORAMENTO: Nos últimos sete dias, as precipitações acumuladas não ultrapassaram os 35 milímetros em grande parte da região norte, atingindo somente o estado do Tocantins, noroeste e sudoeste do Amazonas, leste de Rondônia, noroeste e sudeste do Pará e extremo-sul do Amapá. A umidade do solo esteve mais elevada no estado do Tocantins, oscilando entre 50 e 70 milímetros. No nordeste e sul do Pará; sudeste, noroeste e sudoeste do Amazonas e no oeste do Acre as reservas hídricas variaram entre 30 e 50 milímetros. Nas demais áreas, a umidade não excedeu os 25 milímetros. A estiagem agrícola não ultrapassa os 50 dias na maior parte da região. Somente no noroeste do Pará e no Amapá que a estiagem oscilou entre 90 e 120 dias. Para acessar o Boletim Agrometeorológico na íntegra basta clicar no mapa ao lado na região desejada.



PREVISÃO: Nessa próxima semana, as acumulações de precipitações atingirão grande parte da região e devem oscilar entre 40 e 70 milímetros no sul do Amapá; centro-sul do Pará; noroeste de Tocantins; nordeste, sudeste e centro-sul do Amazonas, em todo o estado de Rondônia e no leste do Acre. Já no noroeste e sudoeste do Amazonas e no oeste do Acre, os acumulados serão ainda mais intensos, variando entre 70 e 100 milímetros. No norte de Roraima, em todo o Amapá e no noroeste do Pará, as precipitações não ultrapassarão os 40 milímetros. As temperaturas máximas variam entre 31°C e 33°C em grande parte da região. Somente no sudeste e noroeste do Pará que as máximas poderão oscilar entre 33°C e 35°C. As temperaturas mínimas podem ficar 22° e 24°C. Exceção feita para o noroeste do Pará onde as mínimas devem ficar entre 24°C e 26°C. Nas próximas 48 horas, toda a região apresenta condições de colheita razoável. Em relação aplicação de tratamentos fitossanitários, há necessidade no extremo norte do Tocantins, nas porções nordeste, noroeste e central do Pará região. Apresentam necessidade de irrigação o estado do Amapá e as porções central e noroeste do estado do Pará, e no centro-sul do Amapá. São necessárias aplicações de métodos de irrigação agrícola em toda região norte, com exceção para o estado do Tocantins. A aplicação de defensivos agrícolas segue em condições favoráveis. Em se tratando do manejo do solo seguem em condições favoráveis nas porções nordeste e sul do Tocantins, nas proximidades dos municípios de Rodrigues Alves e Porto Valter no estado do Acre e no noroeste e sudeste do Amazonas. Nas demais localidades, as condições de manejo variam entre razoáveis e desfavoráveis.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ALGODAO HERBACEO
 AMENDOIM
 ARROZ SEQUEIRO
 CAFE ARABICA IRRIGADO
 CAFE ROBUSTA SEQ
 FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
 MAMONA
 MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
 MILHO DE SEQUEIRO
 SOJA DE SEQUEIRO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
 Embrapa Informática Agropecuária
 Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura