


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas da Região Norte


Boletim Número: 548

Boletim Agrometeorológico da Região Norte
 Período: 21/12/2009 a 28/12/2009

MONITORAMENTO: Nos últimos sete dias, as precipitações acumuladas que atingiram grande parte da região norte registraram entre 25 e 45 milímetros. Já no sudoeste e sudeste do Amazonas e centro-sul do Tocantins os acumulados foram mais representativos, variando entre 55 e 75 milímetros. No nordeste do Pará os acumulados mais intensos oscilaram entre 75 e 95 milímetros. Por outro lado, nos estados do Amapá e noroeste do Pará não chegaram a registrar acumulados. A umidade do solo variou entre os 55 e 75 milímetros em quase toda a região norte. Exceto no noroeste do Pará e na totalidade dos estados do Amapá e de Roraima que a reserva hídrica no solo não ultrapassou os 25 milímetros. A estiagem agrícola não ultrapassa os 30 dias na maioria dos estados da região norte. Somente no noroeste do Pará e no estado do Amapá que a estiagem se prolonga um pouco mais, variando entre 60 e 80 dias.



PREVISÃO: Nessa próxima semana, as acumulações de precipitações atingirão toda a região norte e devem variar entre 60 e 80 milímetros. Já no Pará e no Tocantins os acumulados podem ser ainda mais significativos, oscilando entre 100 e 130 milímetros. As temperaturas máximas podem oscilar entre 29°C e 31°C em grande parte da região. No norte do Pará e nos estados de Roraima e Amapá as máximas devem ser ainda mais elevadas, registrando entre 32°C e 34°C. Já as temperaturas mínimas podem ficar 20° e 22°C. Nas próximas 48 horas, toda a região apresenta condições de colheita razoável. Em relação aplicação de tratamentos fitossanitários não há necessidade na região. Apresentam necessidade de irrigação o estado do Amapá e de Roraima. Nas demais áreas não são necessárias aplicação de métodos de irrigação agrícola. A aplicação de defensivos agrícolas segue em condições desfavoráveis a critica na maioria dos estados da região norte, com exceção para os estado de Rondônia e Tocantins que seguem entre condições razoáveis a desfavoráveis. Em se tratando do manejo do solo seguem entre condições favoráveis a razoáveis nos estados do Amazonas, Tocantins, Acre, Noroeste e Sudoeste do Pará, centro-sul de Roraima e Rondônia. Nas demais áreas, as condições de manejo devem seguir entre desfavoráveis a críticas.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ALGODAO HERBACEO
AMENDOIM
ARROZ SEQUEIRO
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA SEQ
FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
MAMONA
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
MILHO DE SEQUEIRO
SOJA DE SEQUEIRO



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura