

Promoção:



DFA-AM

DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA
NO ESTADO DO AMAZONAS

Apoio:



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

Diagramação & Arte:

Claudeilson Lima Silva

Tiragem: 100 exemplares

Equipe Técnica:

José Clério Rezende Pereira

Luadir Gasparotto

Mirza Carla N. Pereira




*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Amazônia Ocidental
Ministério da Agricultura e do Abastecimento*

*Rodovia Am 010, Km 29, Caixa Postal 319, CEP 69011-970, Manaus - AM
Fones (92) 622-2012 Fax (92) 622-1100
<http://www.embrapa.br>
sac@cpaa.embrapa.br*



BANANA CAIPIRA CULTIVAR RESISTENTE À SIGATOKA NEGRA



Amazônia Ocidental

**Manaus-AM
setembro 2000**

**EMBRAPA AMAZONIA OCIDENTAL
DELEGACIA FEDERAL DE
AGRICULTURA-AM**

A cv. Caipira é oriunda da África Ocidental, onde é conhecida como cv. Yangambi Km 5. Foi introduzida no Brasil pela Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas-BA e destaca-se por apresentar resistência à Sigatoka negra, Sigatoka amarela e mal-do-Panamá.

É uma cultivar bastante rústica, com excelente vigor vegetativo, entretanto, recomenda-se seu cultivo em solos profundos, bem drenados e com bom nível de matéria orgânica, para que possa expressar resistência às doenças com todo seu potencial.

Pode atingir produtividades entre 19 e 25 ton/ha quando manejada corretamente, através de capinas, adubações, desfolhas e desperfilhamento, que nessa cultivar é abundante e deve ser feito sistematicamente.

A cv. Caipira apresenta porte baixo, pseudocaule verde-amarelo pálido. As folhas são eretas e estreitas com as margens dos pecíolos avermelhados. Os frutos são arredondados, semelhantes aos da cultivar Maçã.

Esta cultivar apresenta grande potencial para o Amazonas, tanto para consumo "in natura" quanto para agroindustrial, pelo seu elevado teor de açúcar.



Principais características fitotécnicas da cv. Caipira, nas condições do Amazonas. Embrapa Amazônia Ocidental.

Plantio/colheita	361 dias
Peso do cacho	17 kg
Peso das pencas	15 kg
Número de frutos/cacho	130
Porte	Médio/Baixo
Sabor	Doce
Resistência ao despencamento	Média
Pedicelo	Rígido
Perfilhamento	Abundante

Reação da cv. Caipira às principais doenças da bananeira.

Doença	Reação*
Sigatoka negra	R
Sigatoka amarela	R
Mal-do-Panamá	R
Moko	S

*R = Resistente

S = Suscetível

das percas de amônio
Uréia

Equipe Técnica:

José Clério Rezende Pereira

Luadir Gasparotto

Mirza Carla N. Pereira