

**Colheita e Qualidade Fisiológica
das Sementes de Arroz Irrigado
Cultivar BRS Jaburu em Roraima.**

República Federativa do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Reinhold Stephanes

Ministro

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa

Conselho de Administração

Luis Carlos Guedes Pinto

Presidente

Sílvio Crestana

Vice-Presidente

Alexandre Kalil Pires

Ernesto Paterniani

Hélio Tollini

Marcelo Barbosa Saintive

Membros

Diretoria–Executiva da Embrapa

Sílvio Crestana

Diretor-Presidente

José Geraldo Eugênio deFrança

Kepler Euclides Filho

Tatiana Deane de Abreu Sá

Diretores-Executivos

Embrapa Roraima

Antonio Carlos Centeno Cordeiro

Chefe Geral

Roberto Dantas de Medeiros

Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

Miguel Amador de Moura Neto

Chefe Adjunto de Administração



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro de Pesquisa Agroflorestal de Roraima
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

**ISSN 1981 - 609X
Maio, 2007**

Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 03

Colheita e Qualidade Fisiológica das Sementes de Arroz Irrigado Cultivar BRS Jaburu em Roraima.

Oscar José Smiderle
Paulo Roberto Valle da Silva Pereira
Antônio Carlos Centeno Cordeiro

Boa Vista, RR
2007

Embrapa Roraima, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento,
Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

Embrapa Roraima

Rodovia BR-174, km 8 - Distrito Industrial

Cx. Postal 133 –CEP. 69.301-970

Boa Vista- Roraima-Brasil

Telefax: (95) 3626.7125

Home page: www.cpafr.embrapa.br

E-mail: sac@cpafr.embrapa.br

Comitê de Publicações da Unidade

Presidente: Roberto Dantas de Medeiros

Secretário-Executivo: Alberto Luiz Marsaro Júnior

Membros: Aloísio Alcântara Vilarinho

Gilvan Barbosa Ferreira

Kátia de Lima Nechet

Liane Marise Moreira Ferreira

Moisés Cordeiro Mourão de Oliveira Júnior

Normalização Bibliográfica: Maria José Borges Padilha

Editoração Eletrônica: Vera Lúcia Alvarenga Rosendo

1ª edição

1ª impressão (2007): 300

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Embrapa Roraima

Smiderle, Oscar José

Colheita e qualidade fisiológica das sementes de arroz irrigado Cultivar BRS Jaburu em Roraima / por Oscar

Smiderle, Paulo Roberto Valle da Silva Pereira e Antonio Carlos Centeno. Boa Vista: Embrapa Roraima, 2007.

16 p. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento/ Embrapa Roraima; 3).

1. Oryza sativa – produtividade – armazenamento. 2. Roraima. I. Título. II. Série.

CDD: 633.18098114

SUMÁRIO

Resumo.....	4
Abstract.....	5
Introdução.....	6
Material e Métodos.....	7
Resultados e Discussão.....	9
Conclusões.....	12
Referências Bibliográficas.....	12

Colheita e Qualidade Fisiológica das Sementes de Arroz Irrigado Cultivar BRS Jaburu em Roraima.

Oscar José Smiderle¹
Paulo Roberto Valle da Silva Pereira²
Antonio Carlos Centeno Cordeiro¹

RESUMO

A época de colheita é um dos fatores mais importantes que influenciam as características da semente de arroz. Com o objetivo de determinar uma faixa adequada de colheita do arroz (*Oryza sativa* L.) irrigado BRS Jaburu, sementes dessa cultivar foram colhidas aos 22, 29, 36, 43, 50 e 57 dias após o florescimento e avaliadas quanto à umidade, viabilidade, massa seca de 100 sementes, produtividade e qualidade durante doze meses de armazenamento. As sementes colhidas aos 22 dias após o florescimento apresentaram boa qualidade, mesmo tendo alto valor de umidade inicial. Sementes colhidas aos 57 dias apresentam perda de qualidade no armazenamento. A melhor faixa de colheita, na cultivar BRS Jaburu, é dos 29 a 36 dias após o florescimento, quando as sementes apresentam maior qualidade, produtividade e reduzida dormência.

Palavras-chave: *Oryza sativa*, umidade, produtividade, armazenamento, Roraima

¹ Pesquisador DSc. Embrapa Roraima. CP 133 CEP 69301-970. Boa Vista RR. e-mail: ojasmider@cpafrr.embrapa.br

² Pesquisador DSc. Embrapa Trigo. Passo Fundo RS. e-mail: paulo@cnpt.embrapa.br

Harvesting and Physiologic Quality of Cultivar BRS Jaburu the Irrigated Rice Seeds in Roraima

ABSTRACT

Harvesting time is one of most important factors which influence rice seed characteristics. With the objective of determining the proper period to harvest irrigated rice (*Oryza sativa* L.) BRS Jaburu, seeds of this cultivar were harvested 22, 29, 36, 43, 50 e 57 days after flowering and evaluated in relation to moisture, viability, dry mass of 100 seeds, productivity and quality within twelve months storability. Seeds harvested 22 days after flowering showed good quality, although presenting high content of initial humidity. Seeds harvested at the 57th day showed loss of quality concerning storage. The best harvesting period, for BRS Jaburu, was between 29 an 36 days after flowering, when seeds presented higher quality, yield and reduced dormancy.

Keywords: *Oryza sativa*, moisture, productivity, storage, Roraima

Introdução

A qualidade física e fisiológica da semente de arroz depende da cultivar, estágio de maturação, conteúdo de umidade e danos mecânicos (impactos, abrasões e tensões) que podem ocorrer durante a colheita, secagem, beneficiamento e mesmo no armazenamento.

Colher na época certa é de fundamental importância para se obter um produto de melhor qualidade. O arroz atinge o ponto de maturação adequado quando dois terços dos grãos da panícula estão maduros. A colheita antecipada, com umidade elevada, aumenta a proporção de grãos malformados e gessados. O arroz colhido tardiamente, com umidade muito baixa, afeta a produtividade pela degrana natural (DORFMAN & ROSA, 1980).

Arroz trincado é mais susceptível à infestação por insetos. O trincamento também tem a desvantagem de poder reduzir a viabilidade ou o valor de plantio do arroz para semente. Trincas que ocorrem através de toda a secção da semente diminuem o vigor da plântula pela redução da disponibilidade de endosperma, e, conseqüentemente, de nutrientes durante a fase de germinação e emergência (STEFFE et al., 1980).

Colheita precoce resulta em decréscimo na produção pelo desenvolvimento incompleto das sementes, que se apresentam, com alto conteúdo de umidade, freqüentemente estão gessadas. Um excessivo número de sementes imaturas também é produzido quando utilizadas cultivares de maturação desuniforme. Grãos gessados, além de conferirem má aparência ao produto acabado, são mais fracos e quebram-se nas operações de beneficiamento (JULIANO, 1980; LUH & MICKUS, 1980 e WEBB, 1980).

O estágio de maturação também influencia a viabilidade e o vigor dos grãos de arroz para fins de semeadura. O ponto de completa maturação da semente é geralmente considerado como o ponto em que ela atinge a máxima massa seca durante a fase de desenvolvimento e maturação no campo (RAJANNA & ANDREWS, 1970; GONÇALO & MACIEL, 1975). Em São Paulo, Lago et al. (1991) verificaram que o melhor intervalo de colheita da cultivar IAC 4440 (arroz irrigado) é o de 36 a 43 dias após o florescimento. Sementes colhidas antes da completa maturação são mais leves, mal formadas e menos vigorosas, com reflexos negativos no armazenamento e após o plantio no campo.

A dormência em sementes de arroz, principalmente quando recém-colhidas, pode apresentar obstáculos à sua análise, comercialização e plantio imediato. Sendo que a intensidade e persistência dessa dormência varia muito com a cultivar. Buenaventura

(1956) relatou que o período de dormência, pós-colheita, de 52 variedades filipinas de arroz, variou de zero a 11 semanas. As percentagens de germinação das sementes recém-colhidas dessas variedades variaram de quase zero a 77. Franco et al. (1997) afirmaram que as sementes de arroz caracterizam-se por apresentarem dormência pós-colheita, que pode persistir por 90 a 120 dias, dependendo da cultivar. Variações semelhantes entre cultivares de arroz também foram constatadas por Lago et al. (1977) e Tella et al. (1977).

A dormência é também influenciada pela época de colheita. Vieira (1975) verificou que a dormência das sementes da cultivar Nato foi muito intensa até 35 dias após a antese, com germinação de apenas 10%. Após 35 dias, a dormência diminuiu e a germinação alcançou 70 a 80% aos 60 e 75 dias após a antese.

Embora o período de dormência das sementes de arroz varie entre cultivares, podendo persistir para algumas cultivares de 90 a 120 dias (FRANCO et al., 1997), as condições de armazenamento principalmente com a elevação da temperatura, segundo Bewley e Bleck (1994), podem reduzir esse período, proporcionando aumentos significativos na germinação das sementes.

A preservação da qualidade fisiológica das sementes mantidas em armazém convencional é um dos desafios enfrentados pela tecnologia de sementes. No armazenamento a longevidade das sementes está sujeita à ação de fatores externos que afetam a qualidade.

Diante da escassez de informações de caráter regional sobre a influência do momento de colheita na produtividade e qualidade de sementes de arroz irrigado, com a presente pesquisa objetivou-se determinar a melhor época de colheita, em função da produtividade e qualidade de sementes de arroz BRS Jaburu produzidas e armazenadas em Boa Vista.

Material e Métodos

O experimento foi instalado em área irrigada por inundação, em solo classificado como GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico, localizada na Fazenda Santa Cecília em Boa Vista estado de Roraima. A cultivar de arroz (*Oryza sativa* L.) estudada foi a BRS Jaburu. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente aleatorizado, em esquema fatorial, composto de seis tratamentos (colheita aos 22; 29; 36; 44; 50 e 57 dias após o florescimento), três períodos de avaliação (zero; seis e doze meses) e quatro repetições.

Cada parcela experimental constou de quatro linhas de seis metros de comprimento, espaçadas 0,30 m entre si, e nas colheitas foram aproveitadas as duas linhas centrais, menos 0,5 m nas extremidades.

As características químicas do solo do experimento foram as seguintes: P (Mehlich-1) traços; matéria orgânica 20,6 g dm⁻³; pH (água) 5,2; K⁺ 48,6 mg dm⁻³; Ca²⁺ 0,67 cmol_c dm⁻³; Mg²⁺ 0,33 cmol_c dm⁻³; textura apresentando 49,6 % de areia; 26,5 % de argila; e 23,9% de silte.

No plantio das parcelas experimentais, foram aplicados 100kg ha⁻¹ de P₂O₅ e 80kg ha⁻¹ de K₂O nas formas de superfosfato simples e de cloreto de potássio, respectivamente. A adubação nitrogenada, na forma de uréia, foi parcelada, sendo aplicados 60kg ha⁻¹ de N no início do perfilhamento e de 60 kg ha⁻¹ na diferenciação do primórdio floral.

As práticas culturais utilizadas, para a implantação e condução dos experimentos, foram efetuadas de acordo com as recomendações técnicas para a cultura do arroz irrigado em Roraima.

Por ocasião do cacheamento, o campo foi vistoriado diariamente para a determinação da data do florescimento, ou seja, do estágio de antese quando havia aproximadamente 50% das espiguetas, considerado como o início do período de desenvolvimento e maturação dos grãos (STANSEL, 1975).

As colheitas foram iniciadas vinte e dois dias após o florescimento e então a intervalos de sete dias, até o total de 57 dias, as panículas foram colhidas manualmente no campo. A trilha foi mecanizada em trilhadeira estacionária e em seguida as sementes foram embaladas em sacos de plástico para minimizar perdas de umidade e levadas ao laboratório.

As sementes obtidas foram imediatamente avaliadas quanto à umidade (base úmida), utilizando-se duas amostras de 100 sementes cada uma, mantidas em estufa a 105°C por 24 horas (BRASIL, 1992). Determinou-se também a massa seca de 100 sementes na colheita (BRASIL, 1992).

As sementes foram secadas a 40°C por 48 a 72 horas, até atingirem umidade em torno de 13%, e então colocadas em condições ambientes de armazém por 4 dias para a uniformização da umidade no interior dos grãos, quando então foram realizadas novas avaliações de conteúdo de umidade, massa de 100 sementes e produtividade. A produtividade, em kg ha⁻¹, foi calculada para a umidade comum de 13,0%.

Em seguida, realizou-se o teste de germinação com quatro repetições de 100 sementes cada uma, que foram colocadas em substrato papel de germinação, formando rolos, mantidas em germinador a temperatura constante de 25°C. A primeira contagem foi realizada aos cinco dias e a última aos quatorze dias (BRASIL, 1992). A primeira contagem de germinação foi considerada como o vigor das sementes. Os testes foram repetidos aos seis e doze meses de armazenamento.

Depois disto, as sementes remanescentes foram mantidas em condições comuns de armazém na Embrapa Roraima, em recipientes de papel, até a realização dos testes aos 6 e 12 meses, para se determinar a qualidade e a dormência das sementes no armazenamento.

Para comparação dos resultados, foram realizadas análises de variância, fazendo transformação dos valores expressos em percentagem para arcoseno ($\sqrt{x + 1/2}$), nas tabelas estão dados médios originais. Para as variáveis que apresentaram efeito significativo pelo teste F, realizaram-se análises de regressão, utilizando-se o pacote estatístico SAS System (SAS, 2003).

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos das determinações de grau de umidade e massa seca de 100 sementes, logo após a colheita e depois da secagem e a produtividade de grãos de arroz, estão expressos na Tabela 1.

Pelos resultados obtidos para a determinação do conteúdo de umidade das sementes, nas seis colheitas realizadas, verifica-se redução inicial maior dos 22 aos 36 dias após o florescimento, e a seguir, moderada até os 57 dias, quando apresentou o percentual de 21,87% (Tabela 1). Após a secagem a umidade das sementes se estabilizou em torno de 11%.

Quanto a massa seca de 100 sementes, na colheita, não houve diferença significativa entre as épocas e o valor médio foi de 2,33g nas seis colheitas realizadas (Tabela 1). Após o procedimento de secagem das sementes a massa seca de 100 sementes apresentou valor inferior na colheita dos 57 dias, com média de 2,60 g, no período. Rajanna & Andrews (1970), estudando a maturação de sementes de arroz da cultivar Bluebonnet-50, constataram que a máxima massa seca foi obtida em época anterior, ou seja aos 25 a 30 dias após a antese. Esse ponto em que o mais alto valor de

massa seca é obtida, coincide, normalmente com o ponto de máxima qualidade fisiológica de sementes em geral.

Tabela 1. Valores médios de produtividade de grãos (kg ha^{-1} , PROD), umidade na colheita (% U_c) e após a secagem (% U_f), massa de 100 grãos na colheita (g M_c) e após a secagem (g M_f), nas seis colheitas (dias) realizadas em arroz irrigado cv. BRS Jaburu cultivado em Boa Vista, RR.

Dias	PROD	U_c	M_c	M_f	U_f
22	4.102 b	27,03 a	2,32 a	2,63 a	10,54 cd
29	5.584 a	26,46 a	2,33 a	2,63 a	11,19 ab
36	5.614 a	24,28 b	2,33 a	2,63 a	11,64 a
43	5.493 a	23,42 b	2,32 a	2,63 a	11,62 a
50	5.353 a	23,15 b	2,32 a	2,63 a	10,98 bc
57	5.261 a	21,87 c	2,34 a	2,45 b	10,11 d
Média	5.235	24,37	2,33	2,60	11,02
CV	12,26%	7,92%	1,06%	2,85%	5,42%
p	p<0,01	p<0,01	n.s.	p<0,01	p<0,01

* Valores precedidos de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente, segundo o teste de Tukey, no nível de 5% de probabilidade. U_c = umidade na colheita; M_c = massa de 100 grãos na colheita; U_f = umidade final; M_f = massa final de 100 grãos.

Os valores de produtividade aumentaram acentuadamente da colheita realizada aos 22 dias para as demais colheitas pelo maior desenvolvimento e maturação dos grãos (Tabela 1). A máxima produtividade de arroz em grãos (5.614 kg ha^{-1}) foi obtida aos 36 dias, com teor de água relativamente alto (24,28%). Não apresentando esta diferença, valor significativo em relação as colheitas realizadas dos 29 aos 57 dias (5.584 e 5.261 kg ha^{-1} , respectivamente). Nas colheitas realizadas aos 22 e 29 dias, o arroz apresentava teores de água maiores (27,03 e 26,46%) do que nas colheitas posteriores.

É importante observar que retardar a colheita de arroz com o objetivo de colher material mais seco, reduzindo gastos com mão-de-obra e energia na secagem, pode ser anti-econômico quando as perdas decorrentes da quebra de grãos e desvalorização do lote sobressaem aos ganhos oriundos do menor custo de secagem.

Os dados de vigor, germinação e dormência de sementes de arroz BRS Jaburu observados nas colheitas e após os dois períodos de armazenamento constam na tabela 2.

Após as colheitas (zero mês), os valores percentuais de germinação foram elevados (>91%) para todas e, em contraposição, os índices de dormência foram elevados (17% a 53%). As percentagens de vigor resultaram em valores pouco superiores de 40%, sendo que na colheita aos 57 dias baixou para 28%. Gonçalo & Maciel (1975), estudando a maturação do arroz 'EEA-404', em Pelotas (RS), verificaram,

aos 22 dias após a antese, valores de vigor próximos de 90%, porém, pontos máximos simultâneos para germinação, vigor e peso seco foi obtido aos 36 dias. Neste trabalho estes pontos máximos foram obtidos com valores inferiores. Os valores médios para sementes dormentes aumentaram significativamente da primeira colheita aos 22 dias (17%) para a quarta colheita aos 43 dias (53%).

Após seis meses de armazenamento, a dormência nas sementes praticamente inexistiu, valores baixos aos seis e doze meses, concordando com os dados obtidos por Franco et al. (1997). As sementes colhidas aos 36 dias apresentaram germinação superior à das demais colheitas, mantendo a qualidade inicial (94 a 93%) podendo ser consideradas como as de melhor qualidade (Tabela 2).

As sementes colhidas mesmo aos 22 dias após o florescimento e nos períodos subseqüentes, apresentaram boa armazenabilidade, com germinação entre 88 e 93% após 12 meses de armazenamento. A germinação das sementes foi maior quando colhidas dos 22 aos 36 dias após florescimento, sendo que aos 12 meses as colhidas aos 36 dias mantêm o mesmo percentual inicial enquanto as colhidas aos 22 e 29 dias perdem germinação. Estes resultados no armazenamento, indicam que o processo de secagem não interferiu na qualidade das sementes (FARONI et al., 1987).

Tabela 2. Resultados médios de vigor, germinação e dormência (%) de sementes de arroz irrigado cv. BRS Jaburu colhidas em seis épocas (dias) após florescimento e avaliadas em três épocas após a colheita, armazenadas em condições de laboratório na Embrapa Roraima, por doze meses.

Dias após florescer	Zero mês			Seis meses			Doze meses		
	vigor	GERM	DORM	vigor	GERM	DORM	vigor	GERM	DORM
22	44 a A	96 a A	17 d A	51 a B	95 a A	0 b B	77a A	91 ab C	1 a B
29	41 a B	94 b A	27 c A	42 b B	94 ab AB	0 b B	49 c A	91 ab B	2 a B
36	41 a B	94 b A	36 b A	41 b B	94 ab A	1 b B	58 b A	93 a A	1 a B
43	40 a B	95 ab A	53 a A	41 b B	92 b AB	2 b B	47 c A	90 b B	1 a B
50	41 a B	94 ab A	47 a A	42 b A	92 b AB	1 b B	46 c A	90 b B	1 a B
57	28 b B	91 c AB	51 a A	32 c A	92 b A	3 a B	32 d A	88 b B	1 a B
F	65,91**	8,88**	115,4**						
CV(%)	4,98	1,33	21,37						

Florescer = colheitas; GERM= germinação; DORM= dormência; **= significativo a 1%.

Letras, minúsculas nas colunas (colheitas) e maiúsculas nas linhas (épocas) distintas, diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

O comportamento inferior das sementes colhidas a partir dos 43 dias, durante o armazenamento, revela que a germinação não pode ser considerada separadamente, como a qualidade das sementes durante a maturação, pois a viabilidade inicial não foi substanciada por outros fatores de qualidade. Ao contrário, as sementes mostraram boa armazenabilidade. As sementes colhidas aos 57 dias apresentaram menor germinação

aos 12 meses de armazenamento, em relação as das demais colheitas com valor ainda bom (88%), mostrando que retardar a colheita das sementes perde-se em armazenabilidade.

Conclusões

As sementes colhidas aos 22 dias após o florescimento apresentam boa qualidade, mesmo tendo alto valor de umidade inicial;

A melhor faixa de colheita, na cultivar BRS Jaburu, é dos 29 a 36 dias após o florescimento, quando as sementes apresentam maior qualidade, produtividade e reduzida dormência.

Referências bibliográficas

BEWLEY, J.D.; BLACK, M. **Seeds**: physiology of development and germination. 2.ed. New York: Plenum Press. 1994. 445p.

BRASIL. Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária. **Regras para análise de sementes**. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 1992. 365p.

BUENAVENTURA, M.R. Dormancy periods of promising rice varieties. **Philippine Agriculture**, Manilla. v.39, p.558-570. 1956.

DORFMAN, E.; ROSA, J.L.V. Ponto de colheita e temperatura de secagem na qualidade do arroz. **Lavoura Arrozeira**, Porto Alegre. v.33, n.318, p.69-74. 1980.

FARONI, L.R.D.; HARA, T.; DALPASQUALE, V.A.; CONDÉ, A.R. **Determinação do rendimento do arroz (cultivar IR 841) após secagem às temperaturas de 50, 60 e 70°C, para períodos de repouso de 30, 60, 120 e 180 minutos**. Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 11/12, n. 1/2, p. 26-31, 1986/1987.

FRANCO, D.F.; PETRINI, J.A.; RODO, A.; OLIVEIRA, A.; TAVARES, W.R.F. Métodos para superar a dormência em sementes de arroz (*Oryza sativa* L.). **Informativo ABRATES**, Curitiba. v.7, n.1/2, p.118. 1997.

GONÇALO, J.F.P.; MACIEL, V.S. Maturação fisiológica de sementes de arroz (*Oryza sativa* L.). **Semente**, Brasília. v.1, n.1, p.21- 25. 1975.

JULIANO, B.O. Properties of the rice caryopsis. In: LUH, B.S. (Ed.) **Rice: production and utilization**. Westport: CT, AVI, 1980. p.403- 438.

LAGO, A.A.; FURLANI, P.R.; AZZINI, L.E. Efeito da temperatura de 50°C na quebra da dormência de sementes de arroz. **Bragantia**, Campinas. v.36, p.XI-XIII. 1977.

LAGO, A.A.; VILLELA, O.V.; MAEDA, J.A.; RAZERA, L.F.; TISSELLI FILHO, O.; MARCHI, L.O.S. Época de colheita e qualidade das sementes da cultivar de arroz irrigado 'IAC-4440'. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília. v.26, n.2, p.263- 268. 1991.

LUH, B.S.; MICKUS, R.R. Parboiled rice. In: LUH, B.S. (Ed.) **Rice: production and utilization**. Westport: CTAVI, 1980. p.501-542.

RAJANNA, B.; ANDREWS, C.H. Trends in seed maturation of rice (*Oryza sativa* L.). **Proceedings of the Association of Official Seed Analysts**, Geneva. v.60, p.188-196. 1970.

SAS INSTITUTE. . SAS/STAT 2003: user's guide: statistics version 9.1. Cary, 2003. 1 CD-ROM.

STANSEL, J.W. **The rice plant-its development and yield**. In: DECADES OF RICE RESEARCH IN TEXAS., 6. Research Monograph, 4, The Texas Agricultural Experiment Station, College Station, Texas, 1975. p.9-21.

STEFFE, J.F.; SINGH, R.P.; MILLER JR., G.E. Harvest, drying and storage of rough rice. In: LUH, B.S. (ed.) **Rice: production and utilization**. Westport: CTAVI, 1980. p.311-359.

TELLA, R.; BANZATTO, N.V.; AZZINI, L.E. **Dormência em arroz**. Campinas: Instituto Agronômico, 1977. 7p. (Circular, 82)

VIEIRA, N.R. **Development and release of seed dormancy in rice (*Oryza sativa* L.) as related to stage of maturity**. Mississippi State: Mississippi State University, 1975. 33p. (Tese Mestrado).

WEBB, B.D. Rice quality and grades. In: LUH, B.S. (Ed.) **Rice: production and utilization**. Westport: CTAVI, 1980. p.543-565.

Embrapa

Roraima

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

