

## PRODUTOR RURAL

PROCURE UM TÉCNICO DA EMATER-PA  
EM SEU MUNICÍPIO  
E SOLICITE MAIORES ESCLARECIMENTOS



PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL  
ARTICULADAS A SERVIÇO DO PRODUTOR RURAL.

NÃO DEIXE que a podridão ...

1988

FD-PP-00721



CPATU- 43244-1



**EMBRAPA**  
Empresa Brasileira de  
Pesquisa Agropecuária  
Unidade de Belém  
UEPAE DE BELÉM

Setor de Difusão de tecnologia

Trav. Dr. Enéas Pinheiro s/n - Marco - C.P. 130

Fone: (091) 226-9460 e 226-7907 - Telex nº (91) 2954

Belém-Pará

FD

43244

00721

EMBRAPA - UEPAE DE BELÉM

# Não deixe que a podridão acabe com o seu mandiocal



BELÉM-PARÁ

1988

## MEDIDAS PARA CONTROLE DE PODRIDÕES RADICULARES EM MANDIOCAIS


- 1) Preparar o terreno da melhor maneira possível, eliminando todas as plantas invasoras existentes.

Em locais com problemas de encharcamento, devem ser feitos drenos..

Se possível fazer plantio em camalhões.

- 2) Não plantar manivas provenientes de áreas com plantas apresentando sintomas de apodrecimento.

- 3) Para plantar use manivas de 20 cm de comprimento, cortadas de plantas com 8 a 12 meses de idade, retiradas das partes inferior e média da planta.



- 4) Tratar as manivas com produtos à base de benomil, utilizando 1 kg/ha colocando as estacas de molho durante 20 minutos.
- 5) Os restos da colheita que ficarem no roçado, devem ser eliminados através de queima.
- 6) Não fazer outro roçado de mandioca em áreas onde ocorreram mais de 3% de plantas com sintomas de podridão radicular.
- 7) Plantar variedades mais tolerantes à doença.
- 8) Fazer rotação de culturas.
- 9) Abandonar as áreas infestadas, por um período de 5 anos.

