


Solos

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Pinheiro Machado

Legenda

- AR1 - Afloamentos rochosos; regosolo distrófico e eutrófico e podzólico bruno-acinzentado eutrófico e distrófico, Ta, A proeminente, textura média/argilosa, relevo ondulado, vegetação campo/mata, fase rasa.
- AR2 - Aflo. rochosos; litossolo e regosolo distr. e eutr., Ta, A proeminente, tex. média, rel. ondulado, veg. campo/mata e pod. bruno-acinz. eutr. e distr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campo/mata, fase rasa.
- AR3 - Aflo. rochosos; litossolo eutr., Ta, A moderado, tex. média, rel. ondulado, veg. arbustiva/campestre, fase cascalhosa; regosolo eutr., Ta, A proeminente, tex. média, rel. ondulado a montanhoso, veg. arbustiva/campestre, fase casc. e pod. bruno-acinz. distr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. montanhoso, veg. campestre, fase rasa-casc..
- AR4 - Aflo. rochosos; litossolo dílico, Ta e Tb, A proeminente, tex. média, rel. escarpado, veg. arbustiva, fase calhaus-casc.; regosolo cármbico distr., Tb, A moderado, tex. arenosa, rel. ondulado, veg. arbustiva, fase arenosa; pod. bruno-acinz., fase hidromórfica e brunizada, tex. argilosa, rel. ondulado, veg. de mata.
- AR5 - Aflo. rochosos e solos litólicos indisc.
- AR6 - Aflo. rochosos; regosolo cármbico lúco, Tb, A proeminente, tex. média, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; solos litólicos casc. indisc. e pod. bruno-acinz. distr., Ta, A proeminente, tex. média, rel. ondulado, veg. campestre, fase rasa-casc..
- Ra1 - Regosolo álico, Tb, A moderado, tex. média, rel. escarpado, veg. campestre, fase calhaus-casc.; solos litólicos indisc. e aflo. rochosos.
- Ra2 - Regosolo cármbico álico, Ta e Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; regosolo distr., Ta, A moderado, tex. média, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; pod. bruno-acinz. eutr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase rasa-casc.
- Ra3 - Regosolo cármbico álico, Ta e Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; regosolo distr., Ta, A moderado, tex. média, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; pod. bruno-acinz. distr., Ta, A proeminente, tex. média, rel. ondulado, veg. campestre, fase rasa-casc. e aflo. rochosos.
- Rd - Regosolo distr. e eutr., Ta, A moderado, tex. média, rel. ondulado, veg. campestre e pod. vermelho-amarelo.
- Re1 - Regosolo eutr., Ta, A moderado, tex. média, rel. forte ondulado, veg. campestre/mata, fase calhaus-casc.; cambissolo dílico, Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. suave ondulado, veg. mata/arbustiva; solos litólicos indisc. e aflo. rochosos.
- Re2 - Litossolo eutr., Ta, A fraco, tex. arenosa, rel. montanhoso, veg. campestre, fase calhaus-casc.; regosolo cármbico eutr., Ta, A fraco, tex. arenosa, rel. forte ondulado, veg. arbustiva, fase calhaus-casc.; regosolo distr. e regosolo álico, Ta, A moderado, tex. média, rel. forte ondulado, veg. arbustiva, fase calhaus-casc.; pod. bruno-acinz. álico, Ta, A moderado, tex. média/argilosa, rel. forte ondulado, veg. arbustiva, fase calhaus-casc. e aflo. rochosos.
- Re3 - Litossolo eutr., Ta, A moderado, tex. média, rel. ondulado, veg. campestre; regosolo indisc.; brunizem avermelhado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase rasa; planosolos indisc. e aflo. rochosos.
- Re4 - Litossolo eutr., Ta, A moderado, tex. média, rel. ondulado, veg. arbustiva/campestre; regosolo eutr., Ta, A proeminente, tex. média, rel. ondulado a montanhoso, veg. arbustiva/campestre, fase casc.; regosolo eutr., Ta, A moderado, tex. média, rel. forte ondulado, veg. campestre/mata, fase calhaus-casc.; cambissolo dílico, Ta, A proeminente, tex. média casc., rel. forte ondulado, veg. campestre, fase rasa-casc. e aflo. rochosos.
- Pv1 - Pod. vermelho-amarelo distr., Tb, A moderado, rel. ondulado, veg. campestre, fase rasa-calhaus; regosolo cármbico distr., Tb, A moderado, tex. arenosa, rel. ondulado, veg. arbustiva, fase arenosa; litossolo eutr., Ta, A fraco, tex. arenosa, rel. montanhoso, veg. campestre, fase calhaus-casc.; regosolo cármbico eutr., Ta, A fraco, tex. arenosa muito casc., rel. forte ondulado, veg. arbustiva, fase calhaus-casc.; regosolo álico, Ta, A moderado, tex. média muito casc., rel. forte ondulado, veg. campestre, fase calhaus-casc.; pod. bruno-acinz. álico, Ta e Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. forte ondulado, veg. campestre, fase rasa-casc. e aflo. rochosos.
- Pv2 - Pod. vermelho-amarelo, fase rasa; pod. vermelho-amarelo distr., Ta, A moderado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre e regosolo distr. e eutr..
- Pv3 - Pod. vermelho-amarelo abrótico distr., Tb, A moderado, rel. ondulado, veg. campestre/mata, fase rasa; pod. bruno-acinz. distr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre/arbustiva, fase rasa; regosolo eutr. e litossolo indisc. e aflo. rochosos.
- Pb1 - Pod. bruno-acinz. distr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase rasa-casc.; regosolo cármbico álico, Ta e Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; regosolo distr., Ta, A moderado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; cambissolo distr., Ta e Tb, A moderado, rel. ondulado, veg. campestre, fase casc.; litossolo indisc. e aflo. rochosos.
- Pb2 - Pod. bruno-acinz. eutr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre/mata, fase rasa; pod. bruno-acinz. eutr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre/arbustiva, fase rasa; regosolo distr. e eutr. indisc..
- Pe1 - Pod. vermelho-escuro distr., Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase arenosa; litossolo distr. e eutr. indisc.; brunizem avermelhado, fases iluvial e rasa; brunizem indisc. e aflo. rochosos.
- Pe2 - Pod. vermelho-escuro distr., Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. suave ondulado, veg. campestre; pod. vermelho-amarelo distr., Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. suave ondulado, veg. campestre/arbustiva e regosolo cármbico distr., Ta, A moderado, tex. média/casc., rel. ondulado, veg. campestre, rel. suave ondulado, veg. campestre.
- Pe3 - Pod. vermelho-escuro distr., Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. suave ondulado, veg. campestre; pod. vermelho-amarelo distr., Tb, A moderado, tex. média/argilosa, rel. ondulado, veg. campestre/arbustiva; regosolo cármbico distr., Ta, A moderado, tex. média/casc., rel. ondulado, veg. campestre, fase casc. e brunizem avermelhado, tex. média/argilosa, rel. suave ondulado, veg. campestre, fases iluvial e rasa.
- B - Brunizem avermelhado, tex. média/argilosa, rel. suave ondulado, veg. campestre, fase iluvial; brunizem avermelhado, tex. argilosa, rel. ondulado, veg. campestre/arbustiva e pod. bruno-acinz. distr., Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. suave ondulado, veg. campestre.
- V - Vertisolos argilosos, rel. ondulado, veg. campestre, fase iluvial e brunizem várzea argilosa, rel. ondulado, veg. campestre, fase iluvial.
- HG - Gleí húmico várzea eutrófico, Ta, A proeminente, tex. média/argilosa, rel. plano, veg. aquática e solos orgânicos indisc..
- Ae - Solo aluvial várzea eutr. indisc.



ASPECTOS FÍSICOS

Área: 2566 Km²
Mesorregião: 07
Microrregião: 032
Coordenadas da Sede: - Latitude: 31°35'29"S
- Longitude: 053°21'48"E
Coordenadas UTM: - N: 273800,00
- E: 6503765,00

PROJEÇÃO UNIVERSAL DE MERCATOR

ESCALA APROXIMADA- 1:290.000

ESCALA GRÁFICA

0 3 6 9 Km

EXECUÇÃO: 1998

FONTE: CLM - SOMBROEK (1969)

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

3008/2 PALMAS	2996/3 MINAS DO CAMAGUÁ	2996/4 SANTANA DA BOA VISTA
3008/4 SEIVAL	3009/1 ABERTO DO CERRO	3009/2 ARRÓO BARRACÃO
3017/1 TUPI SILVEIRA	3009/3 TORRINHAS	3009/4 PIRATINI
3017/2 PEDRAS ALTAS	3018/1 PINHEIRO MACHADO	3018/2 PASSO DO COUTINHO
3017/4 PASSO DA ÁREA	3018/3 CERRO CHATO	

