

**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Soja**

Rodovia Carlos João Strass acesso Orlando Amaral
Caixa Postal 231 - CEP: 86001-970 Londrina PR
Telefone: (43) 3371 6000 Fax: (43) 3371 6100
www.cnpso.embrapa.br e-mail: sac@cnpso.embrapa.br

Embrapa Trigo

Rodovia BR 285 Km 294
Caixa Postal 451 - CEP: 99001-970 Passo Fundo RS
Telefone: (54) 3316 5800
www.cnpt.embrapa.br e-mail: sac@cnpt.embrapa.br

**Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Londrina**

Rodovia Carlos João Strass acesso Orlando Amaral
Caixa Postal 231 - CEP: 86001-970 Londrina PR
Telefone: (43) 3371 6300 Fax: (43) 3371 6120
e-mail: enldb.snt@embrapa.br

Escritório de Negócios de Ponta Grossa

Rodovia do Talco Km 3
Caixa Postal 97 - CEP: 84001-970 Ponta Grossa PR
Telefone/Fax: (42) 3228 1500
e-mail: enpga.snt@embrapa.br

Texto:

Pedro Luiz Scheeren
Dionísio Brunetta
Manoel Carlos Bassoi
Sergio Roberto Dotto (SD Pesq. Ass. Agrícola)
Luís César Vieira Tavares
Luiz Carlos Miranda
Osmar Paulo Beckert
Martha Zavaris de Miranda
Maria Irene B. de Moraes Fernandes
Alfredo do Nascimento Junior

Folder nº: 05/2007
Maio/2007

Tiragem: 2.000 exemplares

Parceria:



FUNDAÇÃO MERIDIONAL
DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA

Av. Higienópolis, 1100 - 4º andar
CEP 86020-911 - Londrina, PR
Fone: (43) 3323-7171 Fax: (43) 3324-6742
www.fundacaomeridional.com.br
meridional@fundacaomeridional.com.br

Apoio:



Bayer CropScience

Ministério da Agricultura, Governo
Pecuária e Abastecimento Federal



Trigo BRS Tangará



FUNDAÇÃO MERIDIONAL

Embrapa


Trigo BRS Tangará

- Boa qualidade de panificação
- Boa sanidade, destaque para a resistência da ferrugem da folha e oídio
- Bom potencial produtivo

Por apresentar um glúten forte e bem balanceado, a cultivar BRS Tangará é uma boa opção para um mercado cada vez mais exigente em farinha para o fabrico do tradicional pão "francês". Juntamente com essas características industriais, a cultivar apresenta boa resistência ao oídio e à ferrugem da folha. Tem uma ampla adaptação geográfica e não apresenta limitações quanto à data de semeadura, desde que respeitadas as épocas recomendadas pela pesquisa, para cada região. Apesar de ser uma cultivar de ampla adaptação geográfica, o seu "pico de rendimento" pode ser alcançado em locais com temperaturas mais amenas.

Regiões de Adaptação *

Regiões 6, 7 e 8 do Paraná.



* Em processo de indicação para 2008.

Rendimento médio em ensaios, em kg/ha, por área de adaptação

Cultivar	Região 6 norte do PR	Test. %	Região 7 centro-oeste do PR	Test. %	Região 8 sul do PR	Test. %
BRS Tangará	3.717	100	3.664	104	4.349	101
Testemunhas	3.712	100	3.514	100	4.295	100

Dados de 2005 e 2006.



Cruzamento: BR 23*2/PF 940382

Características

Ciclo: Médio
Espigamento: 69 dias
Maturação: 123 dias
Classe: Trigo Melhorador
Reação ao alumínio: moderadamente tolerante
Acamamento: moderadamente resistente
Debulha natural: resistente
Germinação pré-colheita: moderadamente suscetível

Informações adicionais

Densidade: 300 a 350 sementes/m²
Textura: grão muito duro (índice de dureza 84,0)
Coloração do grão: vermelho
Altura média: 85 cm
Peso médio do hectolitro (PH): 80 kg/hl
Peso médio de mil sementes (PMS): 38 g
Força de glúten média (W): 312 x 10⁻⁴ joules
P/L: 1,04
P/G: 4,4
Est: 5,0

Reação a doenças

Ferrugem da folha	Resistente
Ferrugem do colmo	Resistente
Giberela	Moderadamente Suscetível
Oídio	Resistente
Manchas foliares	Moderadamente Suscetível
Vírus do mosaico	Moderadamente Suscetível
Brusone	Moderadamente Suscetível
Vírus nanismo amarelo da cevada	Moderadamente Resistente

Sementes disponíveis na safra de 2009
Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo

Tangará

Presente desde o Sul da Bahia, Minas Gerais e Goiás, até o Rio Grande do Sul. Encontrado também, na Argentina e no Paraguai. É comum nos estratos baixos e médios de florestas úmidas, capoeiras e bordas de florestas. Conhecido também, como dançarino, canto do macaco, pavãozinho.

