



Embrapa

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Rodovia BR 285, km 294 – Caixa Postal 451
99001-970 Passo Fundo, RS
Fone: 54 3316 5800 - Fax 54 3316 5801
E-mail: sac@cnpt.embrapa.br
Embrapa Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Passo Fundo, RS
e-mail: enpfb.snt@embrapa.br
Fone: 54 3311 3666
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

BRS Tertúlia RR



Informações adicionais

A cultivar BRS Tertúlia RR é indicada para cultivo nos estados do RS, de SC, do PR e de SP, devendo ser semeada a partir de 20 de outubro e durante o mês de novembro, em solos de média à alta fertilidade, corrigidos quanto à acidez. Na semeadura, utilizar densidade de 10 a 16 plantas por metro de linha, de acordo com a época em que for semeada, com a fertilidade do solo e com a altitude. A cultivar BRS Tertúlia RR apresenta porte alto e, por isso, requer baixa população de plantas nas áreas com altitude superior a 600 metros.

Produzido pela equipe de Comunicação
Empresarial da Embrapa Trigo
Responsabilidade Técnica: Paulo Fernando
Bertagnolli, Leila Maria Costamilan e
Lisandra Lunardi
2010 - Tiragem: 2.000 exemplares

Lançamento

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



FUNDAÇÃO
PRO-SEMENTES

Embrapa
Trigo


BRS Tertúlia RR

A soja BRS Tertúlia RR é uma nova opção de ciclo precoce para o agricultor.



Região de adaptação

- RS
- SC
- PR
- SP



Rendimento de grãos

(kg/ha)

RS	SC	PR	SP
4.012	4.038	5.985	5.354

Cor

Flor	Pubescência	Hilo
Branca	Cinza	Marrom claro

Ciclo

- Precoce
- Grupo de maturidade - 6.6

Altura média de planta

- RS - 86 cm
- SC - 75 cm
- PR - 82 cm
- SP - 65 cm

Teor de óleo

- 20,8%

Teor de proteína

- 36,2%

Peso de 100 sementes

- 17,0 g

Destques

- Bom crescimento e desenvolvimento.
- Resistente à podridão radicular de fitóftora.
- Moderadamente resistente ao nematoide de galhas (*Meloidogyne javanica*).
- Melhor desempenho nas regiões 102, 103, 201, 203 e 204.

Reação a doenças

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã	Resistente
Mosaico comum	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível
Nematoides de galhas (<i>M. incognita</i>)	Suscetível
(<i>M. javanica</i>)	Mod. Resistente
Oídio	Mod. Resistente
Podridão parda da haste	Resistente
Podridão radicular de fitóftora	Resistente
Pústula bacteriana	Mod. Resistente