




Sistema de Monitoramento Agrometeorológico**Estações Meteorológicas de Região Sudeste**

Boletim Número: 111 de 2010




Boletim Agrometeorológico da Região Sudeste

Período: 08/07/2010 a 15/07/2010

MONITORAMENTO: Na última semana, os acumulados de precipitação atingiram poucas áreas da região sudeste. Os maiores acumulados registrados foram entre 5 e 10 milímetros, ficando restritos apenas ao norte do Espírito Santo. Nas demais áreas, os acumulados não ultrapassaram os 5 milímetros ou não houve registro de acúmulos. A umidade do solo variou entre 25 e 45 milímetros de acúmulo: no extremo sul e litoral do estado de São Paulo; no sudeste e centro-leste de Minas Gerais; no oeste do Rio de Janeiro e em todo o Espírito Santo. Nas demais localidades, as reservas hídricas do solo foram menores, ficando entre 5 e 25 milímetros. A estiagem agrícola oscilou entre os 50 e 70 dias na maior parte da região.



PREVISÃO: Na próxima semana, há previsão aponta que os acumulados de precipitação devem atingir poucas áreas da região sudeste. Os maiores acumulados registrados devem variar entre 10 e 30 milímetros, ficando restritos ao noroeste e nordeste de Minas Gerais, ao litoral norte do Rio de Janeiro e a todo o estado do Espírito Santo. Nas demais áreas, não deve haver registro de acúmulos de precipitação. As temperaturas máximas podem variar entre 27°C e 21°C no noroeste de São Paulo (na divisa com Minas Gerais), bem como no noroeste de Minas Gerais. Nas demais localidades, as máximas devem marcar entre 24°C e 26°C, sendo que no sudeste de Minas Gerais podem oscilar entre 19°C e 21°C. As temperaturas mínimas seguem entre 12°C e 14°C em quase toda região. Com exceção para o sul de Minas, onde as mínimas podem registrar entre 8° e 10° em vista da altitude mais elevada, acentuando a queda da temperatura. Nas próximas 48 horas, as condições de colheita e de aplicação de defensivos agrícolas seguem razoáveis nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, enquanto que em Minas Gerais e Espírito Santo variam entre razoáveis a desfavoráveis. As condições para tratamentos fitossanitários seguem favoráveis para grande parte do sudeste, exceção feita ao norte de Minas Gerais e a todo o Espírito Santo. Haverá necessidade de irrigação agrícola para quase todo o sudeste, exceção feita ao litoral de São Paulo (no entorno de Ubatuba e de Itanhaém). O manejo do solo seguirá desfavorável a razoável em grande parte da região sudeste.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

AMEIXA
FEDAO DE SEQUEIRO 3 SAFRA
FEDAO IRRIGADO
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
NECTARINA
PERA
PESSEGO
UVA AMERICANA
UVA AMERICANA IRRIGADA
UVA EUROPEIA
UVA EUROPEIA IRRIGADA



© 2002-2006 - Agritempo Todos os direitos reservados
Embrapa Informática Agropecuária
Centro Pesquisa Meteorológicas e Climáticas aplicadas à Agricultura