


Mapa de Solos

Município de Iraí




Os solos foram classificados conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, proposto por Santos et al. (2006). Esse sistema evidencia, para levantamentos de reconhecimento, quatro níveis categóricos para as ordens descritas (Neossolos, Cambissolos e Luvisolos).


Classes		Descrição	Área (Km²)	%
	RLe	NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutroférico léptico; LUVISSOLO CRÔMICO Órtico Chernossólico;	29,91	16,72
	TCo	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico Chernossólico; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutroférico léptico; NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico léptico;	24,03	13,43
	RRe	NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico léptico; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutroférico léptico; LUVISSOLO CRÔMICO Órtico Chernossólico;	113,57	63,47
	CUE	CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico; NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico léptico; CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Órtico Saprolítico;	11,44	6,39

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano Central 51°W Gr
acrescidas as constantes 10.000km e 500km, respectivamente
Fuso 22S



Escala 1:80.000
Datum SAD69



Esquema de localização do município de Iraí,
na região do Alto Uruguai - Rio Grande do Sul.