

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Norte

Boletim Número: 532011


Boletim Agrometeorológico da Região Norte
Período: 20/06/2011 a 27/06/2011

MONITORAMENTO: A precipitação acumulada nos últimos 7 dias foi menor na faixa mais ao sul da região Norte. Os estados do Tocantins, Rondônia, Acre e o sul do Pará, registraram chuvas entre 0 e 10 mm no período. O norte do Pará e os estados do Amazonas e do Amapá tiveram acumulados entre 10 e 25 mm, com exceção dos arredores de Belém que acumularam entre 50 e 70 mm de água na última semana. O estado que se apresentou com maior acumulado em toda sua extensão nos últimos 7 dias foi Roraima, com valores entre 25 e 40 mm.

Com as chuvas mais abundantes no norte da região, a umidade do solo também segue maior nesta área. No norte do Amazonas, em Roraima, no norte do Amapá e na região de Belém no Pará a umidade do solo nos últimos 7 dias ficou entre 50 e 65 mm. Já o sul do Amapá e norte do Pará a umidade do solo está entre 35 e 50 mm. No sul do Pará, sul do Amazonas, na maior parte do Acre e em Rondônia os valores registrados foram de 15 a 30 mm. Já o Tocantins é o estado que apresenta as menores umidades no solo, entre 3 e 15 mm na última semana.

A estiagem agrícola pode ser considerada baixa na maior parte da região Norte do país. A parte mais ao norte não ultrapassa os 20 dias sem chuvas acima de 10 mm enquanto na faixa central há entre 20 e 30 dias. Já no sul do Tocantins e do Pará, no centro do Acre e de Rondônia chuvas maiores que 10 mm não ocorrem há cerca de 50 a 70 dias.


A produção da safinha de milho deste ano no Tocantins teve um crescimento de 290,4%, em relação a 2009/2010, passando de 33.250 toneladas para 128.840. Os dados foram divulgados pela Comissão Estadual de Levantamento de Informação Agrícola, formada pela Seagro - Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Desenvolvimento Agrário e demais entidades ligadas ao setor. Plantada logo após a colheita da soja, nos meses de fevereiro e março, a safinha já é responsável por 34% da produção anual de milho no Estado. Nesta safinha, a produtividade média por hectare passou de 3.091 para 4.611 kg/ha. O município de Campos Lindos foi responsável por quase metade da produção na safinha, 42,6%, uma produtividade média de 5.400 kg/ha, em uma área de 12 mil hectares. De acordo com um engenheiro agrônomo da Seagro, vários fatores colaboraram para esse resultado. "O preço favorável do mercado interno e no externo acima da média, em relação à safra anterior, animou muitos produtores e incentivou o aumento da área plantada. Já na produção, a utilização de insumos e defensivos além do uso de tecnologia, foram determinantes para esse crescimento", explicou. E acrescentou que as condições climáticas também colaboraram para o aumento da safinha, já que as chuvas bem distribuídas durante a fase de cultivo das culturas favoreceram a produtividade. (Com Seagro)




PREVISÃO: As chuvas para a próxima semana devem continuar mais abundantes no norte da Região e mais escassas no sul. Em Roraima, no norte do Amazonas, no norte do Pará e no Amapá as chuvas devem acumular entre 60 e 80 mm de chuva, porém próximo a Belém no Pará e Bonfim em Roraima, os acumulados poderão ser maiores neste próximo período, podendo chegar até 90 mm. Ao sul da região Norte choverá menos, e os acumulados para os próximos 7 dias não devem ultrapassar os 20 mm. Quanto às temperaturas, Rondônia deverá marcar as temperaturas mais baixas da região na próxima semana, marcando na maior parte do estado máximas de 23 a 26°C, com pequenos pontos próximos à Ariquemes, Cacoal e Chupungua com temperaturas maiores, chegando até 33°C, já as mínimas para o estado ficarão entre 15 e 21°C, sendo as temperaturas menores mais ao sul do estado. Depois de Rondônia as temperaturas menores ocorrerão no Acre e no sul do Tocantins onde as máximas ficarão entre 27 e 30°C e mínimas entre 17 e 20°C. Já no restante da região Norte as máximas devem variar entre 28 e 32°C e as mínimas entre 20 e 24°C.

Para as próximas 48 horas as condições de colheita e de aplicação de defensivos estarão razoáveis na maior parte da região Norte. Apenas no norte do Amapá a aplicação de defensivos estará desfavorável e em toda a área central do Tocantins estará favorável. Para os tratamentos fitossanitários somente estará com boas condições o sul e o centro do Tocantins, toda a Rondônia exceto nas proximidades de Vilhena e em todo o Acre. Considerando a necessidade de irrigação a maioria do território do Norte do país apresenta necessidade de irrigação com exceção do norte de Roraima e do norte e do leste do Pará.

A região Norte se apresenta desfavorável para o manejo do solo na maior parte de seu território. Exceto para o sul do Acre, onde as condições estão razoáveis e para as áreas próximas à Aveiro e Bragança no Pará, aonde as condições vão de razoáveis até favoráveis em alguns pontos.





Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ACAI
 BANANA IRRIGADA
 CAFE ARABICA IRRIGADO
 CAFE ROBUSTA IRRIGADO
 COCO IRRIGADO
 MARACUJA IRRIGADO