PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

BRASIL.GOV

...itoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Nordeste

Boletim Número: 1712011

Boletim Agrometeorológico da Região Nordeste
Periodo: 13/09/2011 a 20/09/2011

MONITORAMENTO: Nos últimos 7 dias as chuvas mais abundantes do Nordeste ocorreram nos arredores de Aracaju em Sergipe, onde os acumulados ficaram entre 10 e 24 mm. Na faixa leste que vai de Santa Cruz Cabrália até Valença na Bahia, nos arredores dos municípios de Conde, Itapicuru, Seabra, Campo Formoso e de Boa Vista do Tupim na Bahia, no centro e no leste de Alagoas e de Pernambuco, no leste da Paraíba e do Rio Grande do Norte e nas proximidades de Morada Nova no norte do Ceará, as precipitações ficaram entre 2 e 10 mm, já no restante do Nordeste não houve registro de chuvas nos últimos 7 dias. Com relação à umidade do solo, as áreas com maior umidade ocorreram próximas à Camamu no litoral baiano, no leste de Pernambuco e nos arredores de Alhandra e de Areia na Paraíba, onde os índices ficaram entre 15 e 35 mm. No restante do Nordeste a umidade do solo variou entre 0 e 15 mm, com a região central e oeste da Bahia, no sul e centro do Piauí e nos arredores de Santa Inês com índices próximos a 0 mm. Quanto à estiagem agrícola, a área mais seca ocorre no centro e oeste da Bahia e no extremo sul do Piauí onde não há registros de chuvas acima de 10 mm entre 130 e 160 dias. Por outro lado nas proximidades de Valença no litoral baiano, no leste de Pernambuco, nos municípios de Carutapera e de Bom Jardim no oeste do Maranhão a estiagem agrícola ficou menor entre 20 e 50 dias. No restante do Nordeste, chuvas maiores que 10 mm não são registradas entre 80 e 110 dias.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desenvolveu uma nova variedade de milho que trará vantagens para os produtores que precisam lutar contra a seca, principalmente no nordeste. Apresentado durante o Semiárido Show em Petrolina (PE), o milho BRS Gorotuba tem ciclo precoce, precisa de pouco investimento no cultivo e já está entre as cultivares indicadas pelos estudos do zoneamento agrícola do Ministério da Agricultura. Entre as principais características da variedade, está o seu ciclo de desenvolvimento precoce, com até menos 20 dias no tempo de maturação. O período curto faz com que a variedade fique menos tempo exposta à escassez de água e, dessa maneira, corra menos risco de perder produtividade por fatores pluviométricos. Além disso, o Gorotuba é uma cultivar rústica, que exige menos insumos agrícolas e resulta em uma produção mais barata e ideal para o cultivo por agricultores familiares. Por ser uma boa opção para o escalonamento do plantio, permite ao produtor atender as exigências em cultivos tardios, em regiões como a do agreste nordestino. A técnica geralmente é recomendada para estiagens, escassez ou irregularidade da distribuição das chuvas, situação em que os produtores devem utilizar diferentes cultivares para evitar perdas totais ao longo da evolução da lavoura. A vantagem de observar as recomendações do estudo no cultivo é que o zoneamento é utilizado como subsídio na aprovação de crédito rural pelos bancos. (Com: Agronotícias)







PREVISÃO: Nos próximos 7 dias as chuvas devem ser mais freqüentes na região de Salvador onde poderá chover entre 25 e 35 mm. No restante do sul da Bahia, no extremo oeste e na região de Antônio Alves no mesmo estado, além de todo o estado de Pernambuco, Alagoas, do leste de Sergipe, oeste da Paraíba, sul do Ceará, e região central do Piauí e Maranhão, as chuvas devem acumular entre 5 e 20 mm na próxima semana. No restante do Nordeste não há precisão de precipitação para a próxima semana. Com relação à temperatura as áreas mais frias devem ocorrer nas proximidades de Vitória da Conquista e Brumado no sul da Bahia e de Guaranhuns e Arco Verde em Pernambuco, onde as máximas devem variar de 24 a 27ºC e as mínimas de 13 a 16ºC. Já as regiões mais quentes devem ocorrer no centro e norte do Maranhão e do Piauí, onde as máximas devem variar entre 34 e 37ºC e as mínimas de 20 a 23ºC. No restante da região Nordeste as máximas devem ficar entre 29 e 33ºC e as mínimas entre 19 e 23ºC.

Para as próximas 48 horas as condições para colheita e para aplicação de defensivos agrícolas estarão razoáveis na maior parte do Nordeste. No Sergipe e no norte do Piauí, essas condições estarão favoráveis nas próximas 48 horas. Já no Maranhão nos arredores de Lago da Pedra, Estreito, Codó e Alto do Parnaíba e nas proximidades de Teixeira de Freitas no sul da Bahia as condições para a aplicação dos defensivos agrícolas estarão entre desfavoráveis e críticas no período considerado. Com relação aos tratamentos fitossanitários a maior parte do Nordeste apresentará condições adequadas, apenas nas proximidades de Lago da Pedra no Maranhão, no extremo oeste da Paraíba, em todo o estado de Pernambuco e de Alagoas, no norte de Sergipe, na região de Água Nova no Rio Grande do Norte, no sul do Ceará e da Bahia essas condições não estarão adequadas. Há necessidade de irrigação em todo o Nordeste, exceto no norte do Piauí,e no sul do Sergipe. O manejo do solo estará com a maior parte do Nordeste em condições desfavoráveis, as áreas que estarão com as condições entre razoáveis e favoráveis nas próximas 48 horas deverão ocorrer no leste de Pernambuco e da Paraíba, no centro e norte do Piauí, em todo o Sergipe, e nas proximidades de Salvador na Bahia. Já o Maranhão apresentará condições críticas para o manejo do solo nas próximas 48 horas em todo o seu território.







PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ríodo:

CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS
CANA DE ACUCAR IRRIGADA OUTROS FINS
COCO IRRIGADO
GIRASSOL
MAMAO IRRIGADO
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
MARACUJA IRRIGADO
PALMA ZARC
SISAL AGAVE
UVA AMERICANA IRRIGADA
UVA EUROPEIA IRRIGADA