


Mapa de Solos

Município de Rodeio Bonito




Os solos foram classificados conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, proposto por Santos et al. (2006). Esse sistema evidencia, para levantamentos de reconhecimento, quatro níveis categóricos para as ordens descritas (Neossolos, Cambissolos e Luvisolos).

Classes		Descrição	Área (Km²)	%
	RLe	NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico; LUVISSOLO CRÔMICO Órtico chernossólico;	3,18	3,79
	TCo	LUVISSOLO CRÔMICO Órtico chemossólico; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico; NITOSSOLO VERMELHO Eutrófico luvisólico;	38,98	46,40
	RRe	NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico léptico; NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário; CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico;	38,56	45,90
	CUe	CAMBISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico léptico; NEOSSOLO REGOLÍTICO Eutrófico léptico; CHERNOSSOLO ARGILÚVICO Órtico saprolítico;	3,30	3,92

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano Central 51°W Gr
acrescidas as constantes 10.000km e 500km, respectivamente
Fuso 22S

0 0,5 1 2 3 4 Km

Escala 1:55.000
Datum SAD69



Esquema de localização do município de Rodeio Bonito, na região do Alto Uruguai - Rio Grande do Sul.