



Hortaliças

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
BR 060 Km 09 Brasília/Anápolis
Caixa Postal 218, CEP 70359-970, Brasília, DF
Fone: (61) 3385-9110 - Fax: (61) 3556-5744
E-mail: sac@cnph.embrapa.br
<http://www.cnph.embrapa.br>

Equipe Técnica

Embrapa Hortaliças

Valter Rodrigues Oliveira

Leonardo Silva Boiteux

Maria Esther Noronha Fonseca

Agnaldo Donizete Ferreira de Carvalho

Ailton Reis

Nuno Rodrigo Madeira

Patrícia Gonçalves Batista de Carvalho

Waldir Aparecido Marouelli

José Lindorico de Mendonça

Werito Fernandes de Melo

Marcelo Targa de Araújo

Embrapa Semiárido

Carlos Antonio Fernandes Santos

Nivaldo Duarte Costa

Embrapa Clima Temperado

Daniela Lopes Leite

Embrapa Transferência de Tecnologia

Nozomu Makishima - EN Campinas

Odone Bertocini - EN Canoinhas



Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



Tiragem: 1.000 exemplares
Brasília, Setembro de 2011


BRS RIVA

CEBOLA

00236
2011
FD-PP-00236



BRS RIVA: cebola amarela ...
2011 FD-PP-00236



CPATSA-45950-1

Cebola amarela pungente, de excelente padrão comercial



Cebola BRS RIVA



'BRS RIVA' é uma cultivar de cebola (*Allium cepa* L.) amarela do grupo 'Baia' desenvolvida pela Embrapa.

Vantagens

'BRS RIVA' apresenta elevado potencial produtivo de bulbos pungentes com excelente padrão comercial. Possui tolerância alta à mancha púrpura, uma das principais doenças da cultura.

Apresenta boa conservação pós-colheita com época de brotação tardia em condições de temperatura ambiente.

Características

'BRS RIVA' apresenta vigor médio, folhagem semi-ereta, com cerosidade forte e pseudocaule com diâmetro de cerca de 1,7 cm.

Os bulbos têm massa média de 115 g e são de formato globular. A polpa é de coloração branca. Os catáfilos externos são bem aderidos, de espessura média e cor marrom média. O teor de matéria seca é de cerca de 11% e a pungência é alta (cerca de 8 μ mol de ácido pirúvico por grama de massa fresca de bulbo).

O ciclo de maturação é de cerca de 165 dias quando se utiliza o método de transplante de mudas e de 140 dias no de semeadura direta nas regiões Centro-Oeste e Sudeste com semeadura em março-abril. Nestas condições, 'BRS RIVA' produz, em média, 10 t de bulbos comerciais a cada 100.000 plantas até a densidade de 600.000 plantas.ha⁻¹, limite recomendado para a cultivar, o que confere um potencial produtivo de até 60 t.ha⁻¹.

Recomendações técnicas

'BRS RIVA' é indicada para cultivo nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, na faixa de latitudes entre 13 e 23°.

A época de plantio mais indicada é março a maio. Em locais ou períodos do ano de clima ameno, 'BRS RIVA' deverá ser semeada a partir de meados de abril, evitando-se, assim, coincidência da bulbificação com o período mais frio, o que pode ocasionar algum florescimento.

A densidade de plantio recomendada é de até 600.000 plantas.ha⁻¹.

Recomendações técnicas adicionais para o cultivo da cebola poderão ser obtidas na publicação "Cultivo da cebola" no endereço http://www.cnph.embrapa.br/paginas/sistema_producao/sistemas_producao.htm.

Sementes

A Embrapa Transferência de Tecnologia emitirá edital público específico para a assinatura de contratos de parceria com empresas interessadas na produção e comercialização de sementes da cultivar.