



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Trigo
Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologia
Escritório de Negócios de Passo Fundo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rodovia BR 285, km 294 - Caixa Postal 451
99001-970 Passo Fundo, RS
Fone: 54 3316-5800, Fax: 54 3316-5802
E-mail: sac@cnpt.embrapa.br
www.cnpt.embrapa.br*



**FUNDAÇÃO
PRÓ-SEMENTES**


Fundação Pró-Sementes de Apoio à Pesquisa
Rua Diogo de Oliveira, 640
99025-130 - Passo Fundo RS
(54) 3314-8983
E-mail: contato@fundacaoprosementes.com.br
www.fundacaoprosementes.com.br

Produzido pelo Núcleo de Comunicação Organizacional
da Embrapa Trigo
Responsável Técnico:
Paulo Fernando Bertagnolli, Mércio Luiz Strieder e
Giovani Stefani Fae
Fotos: Paulo Fernando Bertagnolli e Giovani Stefani Faé
Dezembro 2011. Tiragem: x.000 exemplares

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento



BRS Tordilha RR



Produtividade, sanidade e precocidade




BRS Tordilha RR

BRS Tordilha RR

- Produtividade
- Ciclo Precoce - Excelente opção para sistema soja/milho safrinha
- Tipo agrônômico
- Resistência a doenças
- Ampla adaptação geográfica

Regiões de adaptação

Macrorregiões sojícolas 1 e 2



Características morfológicas

- Flor branca
- Pubescência cinza
- Hilo marrom claro

Ciclo

- Precoce
- Grupo de maturidade 6.2

Altura média de planta e ciclo

Médias de estatura e ciclo de BRS Tordilha RR em semeaduras realizadas em meados de novembro¹.

	Estatura (cm)	Ciclo (dias)
Macrorregião Sojícola 1		
101	84	126
102	77	123
103	83	133
104	97	124
Macrorregião Sojícola 2		
201	71	121
203	74	119
204	60	112
206	64	106

¹ Pode haver variação em função do ambiente de cultivo.

Reação a doenças

Cancro da haste	Resistente
Mancha olho-de-rã *	Mod. Resistente
Mosaico comum	Resistente
Necrose da haste	Resistente
Nematoide de cisto	Suscetível
Nematoídes de galhas	Suscetível
Oídio	Mod. Resistente
Podridão parda da haste	Mod. Resistente
Podridão radicular de fitóftora	Resistente

* Raças 2, 4, 7, 9, 15 e 17.

Época de semeadura e densidade de plantas

- Nas regiões edafoclimáticas 101 e 102, dar preferência a semeaduras no mês de novembro, na densidade de 300 a 350 mil plantas/ha;
- Nas regiões edafoclimáticas 103 e 104, privilegiar semeaduras no mês de novembro, na densidade de 200 a 250 mil plantas/ha;
- Na macrorregião sojícola 2, privilegiar semeaduras entre meados de outubro e meados de novembro, na densidade de 300 a 350 mil plantas/ha. Evitar semeadura antes de 15 de outubro.