


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico**Estações Meteorológicas de Região Sul****Boletim Número: 0952012****Boletim Agrometeorológico da Região Sul****Período: 18/05/2012 a 25/05/2012**

MONITORAMENTO: Na última semana as chuvas da região Sul se concentraram na região entre Terra Rica e Jardim Olinda, e nos arredores de Nova Tebas no Paraná, nas proximidades de Camburií em Santa Catarina e de Barra do Quaraí no Rio Grande do Sul, onde os acumulados ficaram entre 30 e 45 mm. Nas áreas ao redor destas de maior precipitação, inclusive na região entre Pitanga e Quedas do Iguaçu no Paraná, na faixa entre São Francisco do Sul e Florianópolis em Santa Catarina e nas proximidades de Santa Vitória do Palmar e Uruguaiana no Rio Grande do Sul, as chuvas somaram entre 16 e 28 mm. No restante da região Sul os acumulados foram menores, entre 0 e 15 mm. Quanto à umidade do solo, a maior parte da região sul encontra-se com teores entre 0 e 20 mm. Entretanto na região entre Jaguarão, Bagé, Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Soledade, nos arredores de Rio Pardo, Palmeira das Missões, Barra do Quaraí, São Francisco de Assis, Mostardas e de Coronel Bicaco no Rio Grande do Sul, assim como na região entre Planalto e Francisco Beltrão, nos arredores de Inácio Martins, General Carneiro, Curitiba, Jundiá do Sul, Ribeirão do Pinhal, Querência do Norte, Terra Rica, Janiópolis e Nova Tebas no Paraná, na área envolvida pelos municípios de Lebon Régis, Rio Negrinho, Brusque, São Bonifácio, Otacílio Costa e Taió, e a cerca de Paraíso, São Lourenço do Oeste, Coronel Freitas e Capinzal em Santa Catarina a umidade do solo está entre 40 e 65 mm. Nas áreas ao redor destas os teores de umidade devem ficar entre 20 e 40 mm. Quanto à estiagem agrícola, a maior parte da região Sul apresenta entre 10 e 50 dias sem chuvas maiores que 10 mm. Já nas proximidades de Joinville, Calmon e Caçador em Santa Catarina e de Dom Feliciano no Rio Grande do Sul, há entre 120 e 160 dias sem chuvas desse nível. Nas áreas a cerca destas de maior estiagem agrícola, além das regiões entre Guaíba e Piratini, nos arredores de São Luiz Gonzaga e de Cruz Alta no Rio Grande do Sul, de Araranguá, Criciúma, Tubarão e São Joaquim em Santa Catarina, nas proximidades de Adrianópolis e Sengés no Paraná, há entre 60 e 110 dias de estiagem agrícola.


Os agricultores do sudoeste do Paraná anteciparam a colheita do milho safrinha. As lavouras da região são transformadas em silagem usada para alimentar o gado durante o inverno. O milho é tirado da lavoura ainda verde e em vez de separar só as espigas, o agricultor aproveita a planta inteira. A máquina tritura tudo e transforma em alimento para o gado. Essa foi a alternativa que um agricultor da região encontrou para não perder os 11 hectares de milho já bastante castigados pela estiagem no começo do ciclo. Os produtores da região dificilmente conseguem esperar que as plantas sequem para colher o grão. Uma das lavouras da região precisaria de mais 40 dias para ficar no ponto, mas neste período, é grande o risco da geada prejudicar a produção. Os agricultores investem em variedades precoces, de ciclo menor, para tentar escapar do frio. Em média, 80 dias depois do plantio já é possível fazer a silagem. Em outra, os 24 hectares de milho safrinha, que estão virando alimento para a criação, devem render perto de 800 toneladas de silagem. O corte dos pés é feito antecipadamente para que seja garantida a qualidade da única fonte de alimento para o gado e as ovelhas durante o inverno. (Com: G1.com)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias no Rio Grande do Sul, na maior parte de Santa Catarina e na área entre Guaratuba, Guaraqueçaba, Ponta Grossa, Coronel Domingos Soares, General Carneiro e Lapa no sudeste do Paraná, as chuvas devem ser mais escassas, acumulando de 0 a 15 mm. Na região entre Água Doce e Campo Erê em Santa Catarina as chuvas acumularão de 14 a 20 mm. Já na região entre Bandeirantes e Colorado no extremo norte paranaense as chuvas serão as maiores, podendo acumular de 32 a 38 mm. No restante do Paraná as precipitações ficarão entre 20 e 30 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas mais baixas devem ser registradas na região de Renascença, General Carneiro, Cruz Machado, Pinhão, União da Vitória e Rio Branco do Sul no Paraná, nas áreas a cerca de Bom Jardim da Serra, Urubici, Lages, Campos Novos, Lebon Regis, Caçador Água Doce e São Domingos em Santa Catarina e na região entre São José dos Ausentes, Bom Jesus e Vacaria no norte do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas devem oscilar entre 6 e 10°C. Já em todo o litoral da região Sul e nos arredores de Dois Irmãos das Missões e de São Martinho da Serra no Rio Grande do Sul, e nas faixas entre Porecatu e Querência do Norte e entre Loanda e Foz do Iguaçu no Paraná, as mínimas devem registrar as temperaturas mais elevadas entre 15 e 17°C. No restante da região Sul as mínimas devem ficar entre 11 e 14°C nos próximos dias. Quanto às máximas, as mais baixas devem ser observadas na região de Urubici em Santa Catarina, onde os termômetros deverão marcar entre 15 e 18°C. As máximas mais elevadas devem ocorrer nos arredores de Porto Alegre e Viamão no Rio Grande do Sul onde as temperaturas devem ficar entre 26 e 28°C. No oeste, no norte e no extremo leste do Paraná, no oeste, e na região envolvida pelos municípios de Triunfo, Caçapava do Sul, Santa Maria e Venâncio Aires, além da região de Mostardas no Rio Grande do Sul, na região de Joinville e Blumenau, nos arredores de Criciúma e no extremo oeste catarinense as máximas deverão ficar entre 23 e 26°C. E no restante da região Sul as máximas devem ficar entre 19 e 22°C nos próximos dias.

Para as próximas 48 horas as condições para colheita estarão razoáveis, enquanto para a aplicação dos defensivos agrícolas estarão entre razoáveis e desfavoráveis na maior parte da região Sul. Nas áreas entre São Mateus do Sul, Adrianópolis, Jacarezinho e Teixeira Soares, nos arredores de General Carneiro, de Renascença, de Astorga, nas faixas entre Guarapuava e Nova Tebas, entre Cascavel e Terra Rica e entre Sertaneja e Paranavaí no Paraná, nas proximidades de Barracão, de Soledade e de Frederico Westphalen no Rio Grande do Sul, de Major Vieira, Campos Novos, Água Doce, Ponte Serrada, Seara, Campo Erê e Palmitos em Santa Catarina as condições para colheita deverão estar desfavoráveis e para a aplicação dos defensivos agrícolas entre desfavoráveis e críticas no período considerado. Quanto às condições para os tratamentos fitossanitários, a maior parte da região Sul apresentará condições inadequadas, as áreas onde essas condições estarão adequadas poderão ocorrer nas regiões entre Francisco Beltrão e Santa Helena, entre Irati e Manoel Ribas, nos arredores de Guaraqueçaba, Adrianópolis e Ribeirão Claro no Paraná, nos arredores de Santa Vitória do Palmar, na região envolvida pelos municípios de Bagé, Barra do Quaraí, Santo Antônio das Missões, Alegrete e São Sepé no sul gaúcho, além dos arredores de Pantano Grande, Jóia, São José dos Ausentes e Sananduva no Rio Grande do Sul,

nos arredores de São Joaquim, Criciúma, Palhoça e Lebon Régis em Santa Catarina. Quanto à irrigação, as áreas que precisarão ser irrigadas nas próximas 48 horas deverão ser nos arredores de Clevelândia, Ivaí, Goioerê e de Adrianópolis no Paraná, na faixa entre Canguçu, Dom Pedrito e São Borja e no norte do Rio Grande do Sul, no sul e no oeste de Santa Catarina, no restante da região Sul, não deverá ocorrer demanda hídrica no período considerado. Quanto ao manejo do solo, a maior parte da região Sul apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis nas próximas 48 horas. As áreas que estarão em condições favoráveis no período analisado deverão ocorrer nos arredores Conginhinhas, Ibaiti e Jundiá do Sul, nas proximidades de Icaraíma e nas áreas a cerca de Planalto, Dois Vizinhos e Vitorino no Paraná, de Jaguarão, São Francisco de Assis, Palmeira das Missões, na faixa entre Mostardas e Cidreira e nos arredores de Barra do Quaraí no Rio Grande do Sul, na região entre Lebon Régis e Benedito Novo em Santa Catarina.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [ABACAXI](#)
- [ALGODAO HERB](#)
- [AMENDOIM](#)
- [ARROZ IRRIGADO](#)
- [ARROZ SEQUEIRO](#)
- [BANANA](#)
- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CAFE ARABICA](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [EUCALIPTO DUNNII AGROPECUARIO](#)
- [EUCALIPTO GRANDIS ZONEAMENTO AGROPECUARIO](#)
- [EUCALIPTO SALIGNA AGROPECUARIO](#)
- [EUCALIPTO VIMINALIS AGROPECUARIO](#)
- [FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA](#)
- [GERGELIM DE SEQUEIRO](#)
- [GIRASSOL](#)
- [LARANJA](#)
- [LIMAO ZARC](#)
- [LIMA ZARC](#)
- [MAMAO DE SEQUEIRO](#)
- [MAMAO IRRIGADO](#)
- [MAMONA](#)
- [MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA](#)
- [MARACUJA DE SEQUEIRO](#)
- [MELANCIA DE SEQUEIRO](#)
- [MILHETO ZARC](#)
- [MILHO AGRI](#)
- [PINUS CARIBEA](#)
- [PINUS ELLIOTTII ZARC](#)

PINUS OOCARPA

PINUS TAEDA

POMELO ZARC

SOJA

SORGO

TANGERINA ZARC

TORANJA ZARC

UVA AMERICANA

UVA EUROPEIA