


Sistema de Monitoramento Agrometeorológico**Estações Meteorológicas de Região Norte**

Boletim Número: 2312012

Boletim Agrometeorológico da Região Norte

Período: 10/12/2012 a 17/12/2012


MONITORAMENTO: Na última semana as precipitações da região Norte foram maiores no centro do Amazonas, nas proximidades de Vilhena e de Ariquemes em Rondônia, de Araguaína e de Aparecida do Rio Negro no Tocantins, além dos arredores de Brasília no Acre com acumulados entre 50 e 80 mm. Nas áreas ao redor destas e nas proximidades de Novo Progresso e de Xinguaçu no Pará as chuvas somaram de 25 a 45 mm. Enquanto no restante da região Norte as chuvas somaram de 0 a 20 mm. Quanto à umidade do solo, as áreas mais úmidas estão nos arredores de Bujari e de Mâncio Lima no Acre, de Boca do Acre, Pauini, Manaus, Novo Airão, Apuí e Itacoatiara no Amazonas, nas proximidades de Paranã, na região entre Pium e Figueirópolis, e a cerca de Wanderlândia e Araguatins no Tocantins, além dos arredores de Santana do Araguaia, Tucuruí e Novo Progresso no Pará, onde os teores de umidade devem ficar entre 45 e 65 mm. Nas áreas ao redor destas, nas faixas entre Borba, Beruri, Codajás, Canutama, Itamarati e Atalaia do Norte no Amazonas, na região de Chupinguaia e Rolim de Moura, nas proximidades de Marabá, Cumaru do Norte, Altamira, Uruará, Senador José Porfírio e de Novo Repartimento no Pará e nos arredores de Rorainópolis em Roraima, os teores de umidade devem ficar entre 20 e 40 mm. No restante da região Norte, os teores de umidade do solo serão menores, registrando entre 0 e 20 mm. Quanto à estiagem agrícola, na maior parte da região Norte, a estiagem agrícola está entre 0 e 40 dias. Já na região entre Chaves e Viseu e nos arredores de Prainha no norte do Pará, nas proximidades de Silves no Amazonas e de Machadinho d'Oeste em Rondônia, a estiagem agrícola está entre 80 e 130 dias. Nas áreas ao redor destas de maior estiagem agrícola, no restante do norte do Pará, no sul do Amapá, em todo o estado de Roraima, a cerca de Guajará-Mirim em Rondônia e de Uruará no Amazonas, a estiagem agrícola está entre 50 e 70 dias.



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias, as maiores precipitações devem ser observadas na região entre São Gabriel da Cachoeira e Japurá e a cerca de Manaus no Amazonas, com chuvas que devem acumular de 60 a 85 mm. No restante do Amazonas, em todo o estado do Acre, de Roraima, no norte de Rondônia, no oeste do Pará e nas proximidades de Parauapebas no mesmo estado, as precipitações devem ficar entre 30 e 55 mm. Nas outras áreas as chuvas devem ser mais escassas, podendo acumular de 5 a 25 mm. Quanto às temperaturas, as mínimas mais altas devem ser observadas em todo o estado de Roraima, no leste do Amapá, na faixa entre Viseu e Chaves, no leste do Acre, nos arredores de Manaus e de Lábrea no Amazonas, com temperaturas que devem ficar entre 23,5 e 25°C. Nas outras áreas da região norte as mínimas devem ficar entre 20,5 e 23°C. Quanto às máximas, as mais baixas devem ocorrer em todo o estado do Acre e de Rondônia, no oeste do Amazonas, no norte de Roraima e do Amapá, no sul e leste do Tocantins e a cerca de Jacareacanga no Pará, com temperaturas que devem ficar entre 31 e 34°C. No restante do Pará, no oeste e norte do Tocantins, no leste do Amazonas, no sul de Roraima e do Amapá as máximas devem ficar entre 34 e 37°C.

Para as próximas 48 horas, a maior parte da região Norte apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis para a colheita. Quanto às condições para a aplicação dos defensivos agrícolas, a região Norte apresenta a maior parte de sua área em condições entre razoáveis e desfavoráveis para os próximos dois dias, as áreas onde essas condições estarão críticas devem ocorrer nos arredores de Rio Branco no Acre, de Cacaulândia em Rondônia, de Jacareacanga no Pará, no oeste do Amazonas e a cerca de Normandia e de Uiramutã em Roraima. Quanto aos tratamentos fitossanitários, na maior parte do Tocantins, na região entre Santana do Araguaia e Altamira, além da faixa entre

Portel e Viseu no Pará, no centro do Acre, nos arredores de Nova Mamoré, Alto Alegre dos Parecis, São Francisco do Guaporé, Ouro Preto do Oeste e de Costa Marques em Rondônia, nas proximidades de Vitória do Jari e Mazagão, a cerca da cidade do Amapá no estado do Amapá, no sul e leste de Roraima, as condições para os tratamentos fitossanitários estarão adequadas, no restante da região Norte, essas condições estarão inadequadas. Quanto à irrigação, em todo o Amazonas e Acre, no centro de Rondônia, no centro e norte do Tocantins, no sul e centro do Pará, e nos arredores de Rorainópolis e de Caracará em Roraima, não há necessidade de adição de água nas próximas 48 horas, porém nas outras áreas haverá necessidade de irrigação no período analisado. Quanto ao manejo do solo, a maior parte da região Norte do país apresentará condições entre razoáveis e desfavoráveis nas próximas 48 horas, já na região entre Dianópolis e Lizarda, nos arredores de Piraquê, Tocantinópolis e Araguaatins e na faixa entre Lagoa da Confusão e de Araguacema no Tocantins, na região de Mâncio Lima, Sena Madureira e Brasília no Acre, de Guajará e de Boca do Acre no Amazonas e na região de Santana do Araguaia no Pará essas condições estarão favoráveis nos próximos dois dias.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

ABACAXI
ALGODÃO HERB
AMENDOIM
ARROZ SEQUEIRO
BANANA
BANANA IRRIGADA
CACAU
CAFE ARABICA
CAFE ARABICA IRRIGADO
CAFE ROBUSTA
CAFE ROBUSTA IRRIGADO
CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL
CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS
COCO
COCO IRRIGADO
DENDE DE SEQUEIRO
FEIJAO DE SEQUEIRO 1 SAFRA
GERGELIM DE SEQUEIRO
GIRASSOL
MAMAO DE SEQUEIRO
MAMAO IRRIGADO
MAMONA
MANDIOCA AINPIN MACAXEIRA
MARACUJA DE SEQUEIRO
MARACUJA IRRIGADO
MILHETO ZARC
MILHO AGRI
PIMENTA DO REINO
PUPUNHA
SOJA