



**Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão**

Rod. Goiânia a Nova Veneza km 12 Sto. Antônio de Goiás GO  
Caixa Postal 179 75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO  
Telefone (62) 533 2110 Fax (62) 533 2100  
sac@cnpaf.embrapa.br  
www.cnpaf.embrapa.br

**Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

## **Instituições parceiras na avaliação da cultivar**

1. Embrapa Arroz e Feijão
2. Embrapa Trigo
3. Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri)
4. Coopercampos
5. CEFET - Pato Branco
6. Instituto Agronômico do Paraná (Iapar)
7. Embrapa Transferência de Tecnologia /Escritório de Negócios de Ponta Grossa



Ministério da Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento



Edição: Ronaldo Cordeiro e Roselene Chaves / ACE Embrapa Arroz e Feijão / Tiragem: 500 exemplares / Ano 2004

# **BRS Campeiro**

**Cultivar de Feijoeiro Comum de Grão Preto**



2004

# BRS Campeiro

Cultivar de Feijoeiro Comum de Grão Preto


## BRS CAMPEIRO

Feijoeiro Comum

Grupo Comercial Preto

Recomendado para região Sul do Brasil

BRS Campeiro é uma nova cultivar de grão preto indicada para os plantios de "safra" e "safrinha" nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.



BRS Campeiro mostrou superioridade de 32% em rendimento de grãos quando comparada com a média das testemunhas (Tabela 1).

**Tabela 1.** Produtividade da cultivar BRS Campeiro comparada com a média de duas testemunhas nos Ensaios de VCUda Região Sul, no período de 1999 a 2002.

Estado	BRS Campeiro (kg/ha)	Média das testemunhas <sup>1</sup> (kg/ha)	Rendimento relativo (%)	Número de ambientes
Rio Grande do Sul	1939	1550	125	05
Santa Catarina	2695	2060	131	17
Paraná	2519	1860	137	12
Média Geral	2519	1907	132	-

<sup>1</sup> Testemunhas: Diamante Negro e FT Nobre

BRS Campeiro possui massa média de 100 grãos de 25,4 gramas, com excelentes qualidades culinárias (Tabela 2).

**Tabela 2.** Qualidade tecnológica e industrial dos grãos da cultivar de feijoeiro comum BRS Campeiro, em comparação com outras cultivares de grão preto.

Cultivar	Cocção (minutos)	Sólidos solúveis	Coloração do caldo (%)	Proteína (%)	Fibra (%)	Casca (%)
BRS Campeiro	25,00	8,86	Escuro	22,80	14,00	8,84
BRS Valente	28,10	10,91	Claro <sup>1</sup>	19,25	9,70	11,75
FT Nobre	28,48	11,05	Claro <sup>1</sup>	21,60	-----	13,48
Rio Tabagi	36,00	12,40	Escuro	20,00	12,50	13,10
Diamante Negro	34,02	11,20	Claro <sup>1</sup>	20,00	10,00	11,40

<sup>1</sup> Marrom chocolate

BRS Campeiro apresenta a seguinte reação às doenças:

Doenças	Reação
Mosaico Comum	Resistente
Antracnose	Intermediária
Ferrugem	Intermediária
Mancha-angular	Intermediária
Crestamento-bacteriano-comum	Suscetível
Mosaico Dourado	Suscetível

BRS Campeiro apresenta porte ereto e boa resistência ao acamamento, durante todo o seu ciclo (média de 85 dias da emergência à maturação fisiológica).

