

Sistema de Monitoramento Agrometeorológico

Estações Meteorológicas de Região Sudeste


Boletim Número: 0552013

Boletim Agrometeorológico da Região Sudeste


Período: 21/03/2013 a 28/03/2013

MONITORAMENTO: Na última semana as chuvas da região Sudeste foram maiores nas proximidades de Januária, de Rio Vermelho e de Araxá em Minas Gerais, nos arredores de Barretos, de São José do Rio Preto, de Tambaú, Ribeirão Preto e de Iguape em São Paulo, além das proximidades de Magé no Rio de Janeiro, onde as chuvas somaram entre 80 e 120 mm. Nas áreas ao redor destas, nos arredores de Paracatu, de Juiz de Fora e de Andradás em Minas Gerais as precipitações acumularam de 50 a 70 mm. Na faixa entre Caratinga, Minas Novas, Espinosa e Almenara no nordeste mineiro, em todo o estado do Espírito Santo e nos arredores de São Francisco do Itabapoana no Rio de Janeiro, onde os acumulados da semana ficaram de 0 a 20 mm. No restante da região Sudeste as chuvas acumularam de 20 a 40 mm. Quanto à umidade do solo, a maior parte da região Sudeste registra de 20 a 50 mm. Nos arredores de Mogi das Cruzes, de Angatuba, de Promissão e de Santa Adélia em São Paulo, no sul do Espírito Santo, na região entre Camanducaiade e Ouro Fino, a cerca de Guiricema e de Perdizes em Minas Gerais, os teores estão entre 55 e 75 mm. Já nas faixas entre Unaí, Santa Fé de Minas, São Francisco e Gameleiras, entre Águas Vermelhas e Botumirim, entre Rubim, Teófilo Otoni, Governador Valadares e São Domingos do Prata, nos arredores de Jacuí, de Abaeté, de Coromandel, de Uberlândia e de Santa Vitória em Minas Gerais, nas proximidades de Campos dos Goytacazes, de Maricá, de Cachoeiras do Macacu e de Sapucaia no Rio de Janeiro, nas faixas entre Cananéia e Itararé, entre São Pedro do Turvo e Taciba, entre Jundiá e Santa Gertrudes, entre Santa Fé do Sul e Macedônia, a cerca de Guaíra, de Monte Alto, de Assis, Rancharia e Mirante do Paranapanema no estado de São Paulo a umidade do solo está entre 0 e 20 mm. Com relação à estiagem agrícola, a maior parte do Sudeste apresenta entre 0 e 35 dias de estiagem agrícola, já na região a cerca de Guaíra, de Bebedouro e de Itápolis no estado de São Paulo a estiagem agrícola está entre 40 e 100 dias sem chuvas maiores que 10 mm.

A área de soja plantada na região de Itapeva (SP) aumentou 10% na safra de 2013 em comparação à colheita do ano anterior. Com esse aumento, há mais produto ofertado no mercado e isso tem preocupado os produtores, principalmente por falta de espaço para armazenagem dos grãos. O administrador de uma fazenda produtora de soja na cidade, conta que área plantada passou de 1,6 mil hectares. O volume é 30% maior do que o cultivado em 2012. O agricultor afirma que tinha boas expectativas para esta safra, mas por causa das chuvas e da falta de espaço para o armazenamento, ele não teve o retorno esperado. Explicou ainda que 70% da produção foi vendida para uma empresa multinacional que retira a soja na propriedade e faz a exportação. No entanto, como tem ocorrido congestionamento em portos, a empresa não retirou toda a produção dos silos da fazenda. Com isso, o agricultor está preocupado com os 30% da soja que precisam ser colhidos. “A multinacional está com dificuldade de retirar a soja devido aos problemas que estão ocorrendo nos portos. Os navios estão parados e o frete subiu bastante. A empresa vai deixar para tirar na última hora, quando houve liberação nos portos. A empresa não consegue tirar e esses 30% que sobrou, a gente vai ter que vender para retirar aqui na fazenda. A gente está tendo dificuldade de armazenagem porque os silos todos lotados. Com isso, o preço da soja diminuiu”, explica. A colheita da safra 2013 começou em março e o clima estava ajudando. No entanto, segundo os produtores, a mudança no tempo nos últimos dias pode prejudicar o restante da colheita. Segundo a Coordenadoria de Assistência Integral (Cati), com as plantas molhadas as máquinas param de trabalhar. A chuva no grão em época de colheita ainda afeta a coloração natural da soja. Os grãos ficam mais escuros e ocorre a perda da qualidade. De acordo com o engenheiro agrônomo da Cati, neste período que a soja está agora, a chuva prejudica a colheita. “Dificulta mais a questão da colheita porque atrasa, demora. Se a chuva persistir, evidentemente que vai afetar também a qualidade do grão”, afirma. (Com: G1.com)



PREVISÃO: Para os próximos 7 dias as chuvas da região Sudeste devem ser maiores na faixa entre Unaí, Paracatu, João Pinheiro e Lassance em Minas Gerais, com precipitações que devem somar entre 80 e 100 mm. No centro e leste do estado do Espírito Santo, e em toda a faixa central de Minas Gerais entre Aimorés, Corinto, Buritis e Coromandel as chuvas da semana que vem devem acumular de 40 a 70 mm. Nas outras áreas as chuvas devem ser menores podendo acumular entre 10 e 30 mm. Quanto às temperaturas para a próxima semana, as mínimas mais baixas devem ocorrer no extremo sul de Minas Gerais entre Camanducaia e Virgínia, onde os termômetros poderão registrar de 10 a 14°C. Já nas proximidades de Iguape em São Paulo, a cerca de Araruana no Rio de Janeiro e no litoral do Espírito Santo, as mínimas devem ficar entre 20 e 24°C. No restante as temperaturas devem oscilar de 15 a 19°C. Quanto às máximas, as mais altas devem ser registradas no norte do Espírito Santo, marcando entre 30 e 32°C. Já no sul e centro de Minas Gerais e no sul de São Paulo as máximas devem ser menores, entre 22 e 25°C. Nas outras áreas as máximas devem ficar entre 26 e 29°C no período considerado.



Culturas indicadas pelo Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura neste período:

- [ABACAXI](#)
- [ABACAXI IRRIGADO](#)
- [BANANA IRRIGADA](#)
- [CAFE ARABICA IRRIGADO](#)
- [CAFE ROBUSTA IRRIGADO](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI ACUCAR E ALCOOL](#)
- [CANA DE ACUCAR AGRI OUTROS FINS](#)
- [CANOLA DE SEQUEIRO SAFRA DE INVERNO ZON AGRI](#)
- [COCO IRRIGADO](#)
- [MAMAQ IRRIGADO](#)
- [MARACUJA IRRIGADO](#)
- [TRIGO](#)
- [TRIGO IRRIGADO](#)