



Arroz e Feijão

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Rodovia GO-462 km 12 Zona Rural Caixa Postal 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Telefone (62) 3533-2110 Fax (62) 3533-2100
sac@cnpaf.embrapa.br
www.cnpaf.embrapa.br

Parcerias

- Embrapa Transferência de Tecnologia/Escritório de Negócios de Goiânia
- Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA)
- Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA)
- Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn)
- Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (Emepa)
- Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará (Epace) extinta

2ª edição: Embrapa Arroz e Feijão 2008 / Tiragem: 1.000 exemplares / Programação Visual: Fábio Noliêto / Área de Comunicação e Negócios (ACN)

BRS Marfim

Feijoeiro Comum



Tipo de Grão Mulatinho

Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento




Embrapa
2008

BRS Marfim

Feijoeiro Comum do Grupo Grão Mulatinho

BRS Marfim

A cultivar de feijoeiro comum, **BRS Marfim**, pelo seu potencial produtivo, excelente qualidade culinária, porte semi-ereto e resistência ao acamamento, é mais uma opção para os produtores interessados em produzir feijão de tipo de grão **mulatinho**, nos Estados do **Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás e Distrito Federal.**



Características

Tipo de planta: indeterminado (tipo II), porte semi-ereto não adaptado à colheita mecânica.

Nº médio de dias para floração: 40.

Cor da flor: violeta.

Maturação fisiológica: 85 a 95 dias (ciclo normal).

Cor da vagem na maturação: amarelo com estrias roxas, roxa, arroxeadas com estrias roxas.

Cor do grão: bege claro, opaco.

Peso médio de 100 grãos: 27 gramas.

Recomendações

- A **BRS Marfim** pode ser cultivada em até três épocas indicadas nas Tabelas 1 e 2;
- População final desejável: 230.000 a 250.000 plantas por hectare, em espaçamento de 45 a 50 cm entre linhas, o que consome, em média, 80 kg de semente por hectare.

Tabela 1. Janela de semeadura para Goiás e Distrito Federal.

Estados	1ª Época	2ª Época	3ª Época
GO/DF	Out - Nov	Jan - Fev	Mai - Jun

Tabela 2. Janela de semeadura para os Estados do Nordeste.

Estados	Épocas
BA	Nov - Dez
SE/AL	Abr - Mai
PE	Jan - Fev e Mar - Abr
PB	Mar - Abr
RN	Mai - Jun *
CE	Jan - Fev

* Mais informações consulte a EMPARN (84) 3232-5858.

Informações Adicionais

Nos ensaios realizados pela Embrapa e seus parceiros, a **BRS Marfim** apresentou:

- Potencial de produtividade de 3.335 kg/ha;
- Resistência ao mosaico-comum, reação intermediária à ferrugem, mancha-angular e antracnose, susceptibilidade ao mosaico dourado e crestamento bacteriano comum;
- Uniformidade de coloração e tamanho de grão, com excelentes qualidades culinárias e ótima aparência após o cozimento (Tabela 3).

Tabela 3. Qualidade tecnológica e industrial dos grãos da cultivar de feijoeiro comum mulatinho BRS Marfim.

Cultivar	Cocção (minutos)	Absorção de água (%)	Sólidos solúveis (%)	Grãos inteiros (%)	Proteína (%)
BRS Marfim	30	97,9	9,3	85	22,1

CONSULTE SEMPRE UM PROFISSIONAL LOCAL POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DA LAVOURA. ELE CONHECE A SUA REALIDADE E PODERÁ FAZER AJUSTES FITOTÉCNICOS, RECOMENDAÇÕES FITOSSANITÁRIAS ADEQUADAS E INDICAR A MELHOR ÉPOCA DE SEMEADURA!

