

## ORIGEM

‘Fino’ é um limoeiro verdadeiro [*Citrus limon* (L.) Burm. f.], que foi obtido na Espanha provavelmente da germinação de uma semente de limoeiro ‘Comum’. Também é conhecido como ‘Mesero’, ‘Blanco’ e ‘Primofiori’.

## DISTRIBUIÇÃO

Vem sendo cultivado na Espanha, Itália, Argentina, Uruguai e Estados Unidos.



Ministério da  
**Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento**



Composto e impresso: Embrapa Clima Temperado  
Arte do folder: Antônio Reisser / Agosto de 2013 - Tiragem: 500 exemplares

# ‘FINO’

## Limão do grupo Siciliano

Roberto Pedroso de Oliveira  
Mateus Pereira Gonzatto  
Walkyria Bueno Scivittaro  
Vinicius Ximenes dos Santos  
Fabiana Carrett Timm



## CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

### PLANTA

Vigorosa, com copa de tamanho grande e vegetação compacta.

### RAMOS E FOLHAS

Ramos normalmente com espinhos grandes; folhas de coloração verde-escura, grandes, ovaladas, coriáceas e aromáticas.

### FLORES

Completas, sendo a floração agrupada, com pouca reflorescência.

### FRUTOS

São de tamanho médio, em torno de 110 g; formato variável, de esférico a ovalado, com ausência de pescoço na região peduncular e presença de mamilo pequeno e pontiagudo; casca lisa e delgada, com coloração amarela quando maduros; grande quantidade de suco de elevada acidez e número médio de sementes (4 a 6 por fruto).

## QUALIDADE DOS FRUTOS E MERCADO

Os frutos apresentam excelente qualidade tanto para consumo in natura quanto para a produção industrial de suco.

### ÉPOCA DE PRODUÇÃO

A maturação dos frutos é de meia-estação. No Rio Grande do Sul, a colheita é realizada de junho a setembro. Os frutos podem ser mantidos nas árvores por alguns meses, mantendo-se a qualidade.

### LIMITAÇÕES DA CULTIVAR

Alta suscetibilidade ao cancro cítrico; resistência média ao transporte e ao armazenamento; e baixa tolerância a solos salinizados.

### PORTA-ENXERTO

Recomenda-se o uso da laranjeira ‘Caipira’ e dos limoeiros ‘Cravo’ e ‘Volkameriano’. O Trifoliata, o citrumeleiro ‘Swingle’ e os citrangeiros são incompatíveis com limoeiros do grupo Siciliano.

## BORBULHAS

Podem ser obtidas no Escritório de Capão do Leão (RS) da Embrapa Produtos e Mercado, telefone (53) 3275 9199.

### MUDAS DE QUALIDADE

Podem ser obtidas com viveiristas indicados pela Embrapa.

### ESPAÇAMENTO PARA PLANTIO

Recomenda-se 7 m x 5 m, com densidade média de 285 plantas/ha, desconsiderando-se as áreas ocupadas por quebra-ventos.

### MANEJO DAS PLANTAS

São muito exigentes em adubação, em função da grande exportação de nutrientes. Quanto ao nitrogênio, deve-se dar preferência ao uso de fontes amoniacais ou formadoras de amônio.

### PRODUTIVIDADE

É uma cultivar altamente produtiva. Dependendo das condições de cultivo, a produção anual média atinge 50 toneladas por hectare.