

ACESSO À TECNOLOGIA

- *Aquisição de Publicações.*
- *Consultoria Técnica Especializada.*
- *Palestras Técnicas.*
- *Cursos e Treinamentos.*

CONTATOS

Embrapa Amazônia Oriental
Área de Comunicação Empresarial
Trav. Dr. Enéas Pinheiro s/nº, Bairro do Marco - Belém (PA)
CEP: 66095-100 - Caixa Postal 48
Fone: (91) 3204-1217 Fonefax: (91)3276-0883
E-mail: sac@cpatu.embrapa.br
<http://www.cpatu.embrapa.br>

Pesquisadores Responsáveis

Dr. José E. Urano de Carvalho
Dr. Carlos Hans Müller

Texto

Ana Laura Lima

Layout por Eric Müller / Belém - PA - 2006



Manejo de Bacurizais

Manejo



Sub-Produto

Uma fruta originária da Amazônia Oriental Brasileira que está conquistando o Brasil. É o bacuri, um dos sabores mais populares do Estado do Pará.

O bacurizeiro - cientificamente conhecido como /Platonia insignis/ Mart. - é uma espécie de uso múltiplo: fruto e madeira. A produção de frutos é totalmente oriunda de extrativismo e vem diminuindo em função da derrubada de bacurizeiros para a extração da madeira. Não há dados oficiais sobre a produção de bacuri no Estado. Estima-se que hoje a produção paraense seja de 3.000 a 4.000 t de frutos por ano. A Embrapa Amazônia Oriental vem estudando a domesticação dessa planta há 16 anos.

Frutos



O manejo de bacurizais nativos é um dos principais resultados da pesquisa. Ele consiste basicamente em aproveitar brotações que se originam das raízes do bacurizeiro e ajustar o número de árvores por hectare para que não haja competição entre elas. É a forma mais rápida de se aumentar a produção do bacuri. As plantas manejadas começam a produzir os primeiros frutos entre quatro e cinco anos após o início do manejo, enquanto plantas oriundas de sementes demoram de dez a doze anos

para iniciar a produção. Outro aspecto importante é que essa técnica tem reduzido impacto ambiental e é uma forma de se garantir a variabilidade genética da espécie.