


## Origem

'BRS Pareci' é uma bergamota (mexerica) do grupo das tangerinas (*Citrus deliciosa* Tenore), selecionada a partir de populações de plantas denominadas pelos agricultores de Montenegrina do Cedro e Pareci, derivadas, supostamente, de mutação(ões) espontânea(s) de gema das cultivares Montenegrina e Caí, ocorridas a partir da década de 1980, no Vale do Caí, Rio Grande do Sul.



*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária*  
*Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado*  
*Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*  
BR 392 - km 78 - CEP 96010-971 - Pelotas, RS - Cx. Postal 403  
Fone (53) 3275-8100 - Fax (53) 3275-8221  
[www.cpact.embrapa.br](http://www.cpact.embrapa.br)

Composto e impresso: Embrapa Clima Temperado  
Agosto de 2013 - Tiragem: 200 exemplares



Ministério da  
Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento

G O V E R N O F E D E R A L  
**BRASIL**  
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

# 'BRS Pareci'

bergamota de meia-estação tolerante  
ao cancro cítrico e à tristeza

Roberto Pedroso de Oliveira  
Paulo Sérgio Gomes da Rocha  
Walkyria Bueno Scivittaro  
Vinicius Ximendes dos Santos  
Fabiana Carrett Timm



Embrapa



## Características morfológicas

### Planta

Mais vigorosa que a da 'Caí', com copa de tamanho médio e com tendência de desenvolvimento ereto dos ramos.

### Ramos e folhas

Ramos finos, com alguns espinhos; folhas de tamanho pequeno, lanceoladas e com coloração verde-escura.

### Flores

Completas, pequenas, brancas e com grãos de pólen de alta fertilidade.

### Frutos

Tamanho pequeno a médio, com peso em torno de 90 a 110 g e formato arredondado pouco achatado; a casca é fina, lisa, brilhante e mole, sendo facilmente removida, tendo coloração laranja-amarelado e sendo rica em óleos essenciais; o pedúnculo apresenta estrias, o que o diferencia do da 'Caí'; a polpa é laranja-claro, sucosa, com sabor típico, suave, adocicado e agradável; e os frutos são muito aromáticos, possuindo muitas sementes poliembriônicas pequenas (15 a 25 por fruto).

## Qualidade dos frutos e mercado

Os frutos verdes podem ser destinados à extração de óleos essenciais e os maduros ao consumo in natura e produção de suco. Quando atingem a completa maturação, os frutos devem ser colhidos para não perderem a qualidade.

## Época de produção

A maturação dos frutos é de meia-estação, intermediária entre a 'Caí' e a 'Montenegrina'. No Rio Grande do Sul, a colheita é realizada de junho a julho, porém com concentração de meados de junho a meados de julho.

## Limitações da cultivar

Propensa à produção de grande quantidade de frutos pequenos. Sujeita à alternância de produção, embora menos que a 'Caí'. Suscetível à pintapreta e à rubelose. Frutos sensíveis ao calor, geadas e ventos fortes.

## Porta-enxerto

O Trifoliata é o porta-enxerto recomendado para a produção de frutos de alta qualidade em regiões sujeitas a geadas. Porta-enxertos mais vigorosos, como o limoeiro 'Cravo' e o citrumeleiro 'Swingle', podem ser utilizados em regiões mais quentes, necessitando, porém, de podas mais intensas.

## Borbulhas

Podem ser obtidas no Escritório de Capão do Leão (RS) da Embrapa Produtos e Mercado, telefone (53) 3275 9199.



## Mudas de qualidade

Podem ser obtidas com viveiristas indicados pela Embrapa.

## Espaçamento para plantio

Em função do porte médio das plantas, dependendo do porta-enxerto utilizado e do tipo de solo, recomenda-se espaçamento que varia de 6 m x 3 m a 6 m x 3,5 m, com densidade de 476 a 555 plantas por hectare, desconsiderando-se as áreas ocupadas por quebra-ventos.

## Manejo das plantas

A cultivar é tolerante ao cancro cítrico, sendo recomendada para regiões onde a doença é endêmica. Necessita de poda e de raleio dos frutos para que estes apresentem maior tamanho e para minimizar a alternância de produção.

## Produtividade

É uma cultivar bastante produtiva. Dependendo das condições de cultivo, a produção anual média pode chegar a 25 toneladas por hectare.