

Levantamento de Reconhecimento de Baixa Intensidade dos Solos do Município de Campo Grande - MS

Legenda

GLEISSOLOS HÁPLICOS

- GXd1 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa, A moderado e proeminente, fase campo hidrófilo de surgente, relevo plano.
- GXd2 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura média e arenosa/média, A moderado, fase campo hidrófilo de surgente, relevo plano.
- GXd3 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura média e arenosa/média, A moderado, fase campo hidrófilo de várzea, relevo plano.
- GXbe - Associação de GLEISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico, textura argilosa, A moderado e A proeminente + GLEISSOLO MELÂNICO Tb Eutrófico típico, hístico, ambos textura argilosa, fase campos hidrófilos de várzea, floresta tropical subperenifolia de várzea, relevo plano (70-30%)

LATOSSOLOS AMARELOS

- LAw1 - Associação de LATOSSOLO AMARELO Acriférico típico + LATOSSOLO AMARELO Ácrico típico, ambos textura argilosa, A moderado, imperfeitamente a moderadamente drenados, epialcos, fase campo higrofilo, relevo plano (60-40%)
- LA1 - LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, imperfeitamente drenado, epialco, fase campo higrofilo, relevo plano.
- LA2 - LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, textura média, A moderado, imperfeitamente drenado, fase campo higrofilo, relevo plano (Inclusão de LVA média).
- LA3 - LATOSSOLO AMARELO Distrófico petrolítico, textura argilosa, A moderado, imperfeitamente drenado, epialco, fase campo higrofilo, relevo plano.
- LA4 - Associação de LATOSSOLO AMARELO Distrófico petrolítico, imperfeitamente drenado + LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, ambos A moderado + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, A moderado e proeminente, todos textura argilosa, fase campo higrofilo de surgente, relevo plano (40-35-25%)

LATOSSOLOS VERMELHOS - AMARELOS

- LVAd1 - Associação de LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico + LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, imperfeitamente drenado, ambos textura argilosa, A moderado, fase campo higrofilo de surgente e relevo plano.
- LVAd2 - LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico + LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, ambos textura média, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano (50-50%)

LATOSSOLOS VERMELHOS

- LVd1 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura muito argilosa, A moderado, fase floresta tropical subcaducifólio, relevo plano.
- LVd2 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura muito argilosa, A moderado, fase floresta tropical subcaducifólio, relevo suave ondulado.
- LVd3 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura muito argilosa e argilosa, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano.
- LVd4 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura muito argilosa, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano e suave ondulado.
- LVd5 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura muito argilosa, A moderado, fase campo tropical, relevo plano e suave ondulado.
- LVd6 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo suave ondulado e plano.
- LVf1 - LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico, textura muito argilosa, A moderado, fase floresta tropical subcaducifólio, relevo suave ondulado e plano.
- LVf2 - Associação de LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico típico, A moderado, fase relevo suave ondulado + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico, relevo suave ondulado e ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário, relevo ondulado, ambos A chemozêmico e A moderado, todos textura argilosa, fase floresta tropical subcaducifólio (50-30-20%)
- LVd1 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, fase floresta tropical subcaducifólio, relevo suave ondulado.
- LVd2 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano.
- LVd3 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano.
- LVd4 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura média, A moderado, fase floresta tropical subcaducifólio, relevo plano.
- LVd5 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura média, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano e suave ondulado.
- LVd6 - LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura média, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano e suave ondulado.
- LVd7 - Associação de LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, textura média + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, ambos A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano e suave ondulado (70-30%)

NEOSSOLOS LITÓLICOS

- RLe1 - NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário, textura argilosa, A chemozêmico e A moderado, fase pedregosa e não pedregosa, fase floresta tropical subcaducifólio, relevo ondulado.
- RLe2 - Associação de NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário, textura argilosa, A chemozêmico e A moderado + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico típico, A moderado, ambos textura argilosa fase pedregosa, floresta tropical caducifólio, relevo forte ondulado e ondulado (70-30%)

NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS

- RQo1 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, fase floresta tropical subcaducifólio, relevo ondulado.
- RQo2 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano.
- RQo3 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, A moderado, fase cerrado tropical subcaducifólio, relevo plano.
- RQo4 - Associação de NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, fase campo cerrado tropical, relevo plano e suave ondulado + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura média e arenosa/média, fase campo hidrófilo de várzea, relevo plano, ambos A moderado (80-20%)

PLANOSSOLOS HÁPLICOS

- SXd - Associação de PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico gleissólico, textura arenosa/média e média + GLEISSOLO HÁPLICO Distrófico típico, A moderado e proeminente, textura média + GLEISSOLO MELÂNICO Distrófico típico, hístico, ambos textura média + ORGANOSSOLO HÁPLICO Fibrico típico, todos fase campo hidrófilo de várzea, relevo plano (40-20-20-20%)

Convenções Cartográficas

- Rodovia
Estrada de terra
Ferrovia
Drenagem
- Perfi.
Amostra extra
Área urbana



ESCALA - 1:200.000
ESCALA ORIGINAL - 1:100.000
2010

Projeção Cartográfica: Cônica conforme de Lambert
Meridiano Central: 54° 30'
Paralelo 1: 18° 15'
Paralelo 2: 22° 45'
Latitude origem: 21°
Datum Horizontal: SAD-69

AUTORIA:

Paulo Emilio Ferreira da Motta*, Amaury de Carvalho Filho*, Nilson Rendeiro Pereira*, Silvio Barge Bhering*, Waldir de Carvalho Júnior*, Mario Luiz Diamante Aglio*, Aliton Martins Amorim**, João Sotolaya Takagi*, Carlos Henrique Lemos Lopes**, José Silva de Souza*, Renata S. Rodrigues***, Natália Cristina L. e Silva***

* Embrapa Solos

** SEPROTUR - MS

*** Bolsista Embrapa Solos/ UERJ/ PUC

