




Mapa de Solos da Mesobacia do Igarapé Buiuna/Timboteua, Nordeste do Pará

Convenções Cartográficas

- Localidades
- Estradas
- Drenagem
- Limites Municipais
- Limite Mesobacia

Símbolos das Unidades de Mapeamento		Legenda de Solos	Classificação Taxonômica dos Solos		Quantificação	
					Área (ha)	%
ARGISSOLO AMARELO						
PA	d		ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa e abráptico, textura arenosa/argilosa + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa e abráptico, textura arenosa/média, ambos A fraco, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano (ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico concrecionário).			
					4632,5	53%
GLEISSOLO HÁPLICO						
GX	a		GLEISSOLO HÁPLICO Aluminico típico, textura argilosa/muito argilosa, A proeminente, campo equatorial higrófilo de várzea, relevo plano.			
					138,12	2%
LATOSSOLO AMARELO						
LA	d		LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, textura média, A proeminente e A fraco + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico latossólico, A fraco, ambos floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suavemente ondulado (ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico concrecionário e AFLORAMENTO ROCHOSO).			
					2783,26	32%
NEOSSOLO FLÚVICO						
RY	bd		NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico, textura arenosa/média, A proeminente + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico, textura argilosa/muito argilosa, A hístico, ambos floresta hidrófila de várzea, relevo plano.			
					1176,19	13%
Total					8730,07	100



1:50.000
Informações Cartográficas
Datum Horizontal: WGS 1984 UTM 23 S
Datum Vertical: Imbituba Santa Catarina W.Gr. 51°