


MAPA DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE IRITUIA - PARÁ.¹


Projeção: UTM/SAD69
ESCALA 1:100.000
2000



CONVENÇÕES

- Rodovia Pavimentada
- Rodovia não Pavimentada
- Drenagem
- Área Urbana
- Limite municipal
- Fazendas, vilas, lugares

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO



LEGENDA

SÍMBOLO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO	CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS/UNIDADES DE MAPEAMENTO	QUANTIFICAÇÃO	
		ÁREA (Km ²)	%
PAd1	ARGISSOLO AMARELO ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano.	127,61	9,22
PAd2	ARGISSOLO AMARELO Distrófico A moderado textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano.	77,99	5,63
PAd3	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano + ESPODOSSOLO FERROCÁRBICO Hidromórfico A moderado floresta equatorial subperenifólia relevo plano.	58,38	4,22
PAd4	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico abrupto plintico A moderado textura arenosa/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano.	29,89	2,16
PAd5	ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano.	484,34	34,99
PVd	ARGISSOLO VERMELHO ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura média floresta equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média floresta equatorial subperenifólia relevo plano.	17,61	1,27
PVAd1	ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura média/argilosa floresta equatorial aberta relevo ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura argilosa floresta equatorial aberta relevo ondulado.	47,11	3,40
PVAd2	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico endoconcrecionário A moderado textura média/argilosa floresta equatorial aberta relevo suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico relevo suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.	163,39	11,80
PVAd3	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura média/argilosa floresta equatorial aberta relevo suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico A moderado textura média/argilosa cascalhento floresta equatorial aberta suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa muito cascalhento floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado.	89,09	6,43
PVAd4	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura média argilosa floresta equatorial aberta relevo ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura argilosa floresta equatorial aberta relevo + Alforamento Rochoso relevo ondulado.	33,62	2,43
PVAd5	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura média/argilosa floresta equatorial aberta relevo suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO AMARELO Distrófico A moderado textura média/argilosa cascalhento floresta equatorial aberta relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa muito cascalhento floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado + Alforamento Rochoso relevo suave ondulado.	14,24	1,03
Esg	ESPODOSSOLO FERROCÁRBICO ESPODOSSOLO FERROCÁRBICO Hidromórfico A moderado floresta equatorial subperenifólia aberta relevo plano + NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico típico A fraco floresta equatorial subperenifólia aberta relevo plano.	4,63	0,33
GXbd	GLEISSOLO HÁPLICO GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico A moderado textura indiscriminada floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano.	160,19	11,57
RUBd	NEOSSOLO FLÚVICO NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico	68,99 7,42	4,98 0,54
TOTAL		1.384,50	100,00

¹ - LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ALTA INTENSIDADE

Mapa elaborado a partir da interpretação analógica em imagens LANDSAT-5 TM WRS 223/061D de 08.06.95, composição colorida 5R4G3B, mosaicos semicontrolados de Radar. Base cartográfica obtida mediante uso de cartas planaltimétrica da Diretoria de Serviços Geográficos-DSG. Geoprocessado no Laboratório de Sensoriamento Remoto do CHSRA/SUDAM.