



Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola
Amazônia Oriental
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MAPA DE RECONHECIMENTO DA ALTA INTENSIDADE DOS SOLOS DA FLORESTA ESTADUAL DE ANTIMARI, ESTADO DO ACRE.

ESCALA GRÁFICA
1 Km 0 1 2 3 4 Km

ESCALA 1:50.000
2002

PROJEÇÃO TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM VERTICAL: IMBITUBA-SANTA CATARINA
DATUM HORIZONTAL: SAD-69-MINAS GERAIS
ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM: EQUADOR E MERIDIANO 90° WGR.

SÍMBOLO NO MAPA	LEGENDA CLASSES DE SOLOS UNIDADES DE MAPEAMENTO	QUANTIFICAÇÃO (Km²) %
LATOSSOLO VERMELHO AMARELO	LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrofico típico, textura argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico típico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado.	3,94 0,60
LATOSSOLO VERMELHO AMARELO	ARGILÓSSO AMARELO Distrofico plástico, textura arenosa/ média, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	34,48 5,28
PAd	ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico típico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado.	7,91 1,21
PAd	ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	3,22 0,49
PAd	ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura arenosa/ média, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado.	30,44 4,66
PAd	ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura arenosa/ média, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	9,86 1,51
PAd	ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico típico, textura arenosa/ média, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado.	15,58 2,38
PAd	ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado.	16,26 2,49
PAd	ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Eutáfico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo forte ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico típico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico típico alissólico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano.	49,94 7,64
ALISSOLO CRÔMICO	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado.	31,02 4,75
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado.	28,83 4,41
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico aluminico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano.	39,23 6,00
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia com bambu, relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico aluminico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo plano e suave ondulado.	51,29 7,85
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia com bambu, relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	4,79 0,73
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	46,46 7,11
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	12,91 1,98
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	20,36 3,12
ACt1	ALISSOLO CRÔMICO Argilitívico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + LUVIBSOLO CRÔMICO - Paleo plinto, textura média/argilosa, Amarelo, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado + PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia com bambu, relevo plano.	49,07 7,51
FTvd1	PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia com bambu, relevo suave ondulado.	18,82 2,88
FTvd1	PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia com bambu, relevo suave ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	49,61 7,59
FTvd1	PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, floresta equatorial subperenifólia com bambu, relevo suave ondulado.	44,09 6,75
FTvd1	PLINTOSSOLO ARGILÚVICO Ta Distrofico alissólico epircatrófico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia com bambu, relevo suave ondulado + ARGILÓSSO VERMELHO AMARELO Distrofico plástico, textura média/ argilosa, A moderado, floresta equatorial subperenifólia, relevo suave ondulado.	35,29 5,40
GXvd	TOTAL	653,41 100,00

