


w67°40'

w67°10'



SUDAM
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL




Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Amazônia Oriental
Ministério da Agricultura e do Abastecimento



Ministério
da Agricultura
e do Abastecimento



Governo do Estado
do Acre



s10°00'


s10°30'

w67°40'

w67°10'


MAPA DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO - ACRE.

Projeção: UTM/SAD69
ESCALA 1:100.000
2000



Sinais Convencionais

- Limite Internacional
- Limite Municipal
- Rios, Igarapés
- Rodovia Pavimentada
- Rodovia Não Pavimentada
- Área Urbana



MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

LEGENDA

Simbologia	CLASSE DE SOLOS/UNIDADE DE MAPEAMENTO	Área Km²	%
	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa, floresta equatorial subperenifolia densa, relevo plano e suave ondulado.	109,31	4,81
LVd1			
	LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plintico A moderado textura média argilosa, floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	148,67	6,54
LVd2			
	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plintico A moderado textura média argilosa, floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	69,69	3,07
PVd1			
	ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plintico A moderado textura média argilosa, floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	177,03	7,79
PVd2			
	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado + ALISSOLO CROMICO Argiluvico plintico A moderado textura média argilosa, floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	129,92	5,72
PVAd1			
	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico aluminico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado + PLINTOSSOLO HAPLICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	508,44	22,38
PVAd2			
	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plintico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado + PLINTOSSOLO HAPLICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	379,42	16,70
PVAd3			
	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado + PLINTOSSOLO HAPLICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	21,61	0,95
PVAd4			
	ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico aluminico plintico A moderado textura média argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo suave ondulado e ondulado.	259,92	11,44
PVAd5			
	ALISSOLO CROMICO Argiluvico típico A moderado textura argilosa/muito argilosa floresta equatorial subperenifolia, relevo suave ondulado e ondulado + PLINTOSSOLO HAPLICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura argilosa, floresta equatorial subperenifolia, relevo suave ondulado e ondulado.	178,62	7,86
Act			
	ALISSOLO CROMICO Argiluvico plintico A moderado textura argilosa/muito argilosa floresta equatorial subperenifolia, relevo suave ondulado e ondulado + PLINTOSSOLO HAPLICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura argilosa, floresta equatorial subperenifolia, relevo suave ondulado e ondulado.	174,44	7,68
Actf			
	PLINTOSSOLO HAPLICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo plano + NEOSSOLO FLUVICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo plano + NEOSSOLO FLUVICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura argilosa floresta equatorial subperenifolia densa, relevo plano.	111,92	4,93
FXbd			
	GLEISSOLO HAPLICO Tb Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial de várzea relevo plano + NEOSSOLO FLUVICO Tb Distrófico aluminico A moderado textura indiscriminada, floresta equatorial perenifolia aberta de várzea, relevo plano.	3,25	0,14
GXbd			
	TOTAL	2.272,29	100,00

Nota de Crédito

Mapa elaborado a partir da interpretação analógica em imagem de satélite LANDSAT-TM5, composições coloridas: 4B 5G 7R, WRS-001/067A e WRS-001/067C de Ago/88; WRS-002/067D de Julho/88, conjuntamente com SR4G3B, WRS-001/067A; WRS-001/067C; WRS-002/067D de Junho/96 e mosaicos semicontrolados de imagem de Radar. Base cartográfica obtida mediante uso de cartas plano-altimétricas da Diretoria de Serviços Geográficos - DSG. Geoprocessado no Laboratório de Sensoriamento Remoto da SUDAM/CHSRA.