

Tiragem: 1000 exemplares
Data: Julho/2014




ALIMENTAÇÃO DE BEZERRAS LEITEIRAS

Rafael Alves de Azevedo
Sandra Gesteira Coelho
Fernanda Samarini Machado
Mariana Magalhães Campos
Sâmara Raiany de Almeida Rufino
Pamela Micheli Furini



Escola de Veterinária
UFMG

Embrapa



Leite

O leite é o alimento de maior valor nutritivo para os bezerros.

A quantidade de leite que deve ser fornecida para os animais é de seis litros por dia, distribuído em duas vezes, em horários fixos. A partir dos 40 dias, este fornecimento pode ser realizado somente uma vez ao dia, na parte da manhã.

O fornecimento em sistemas artificiais pode ocorrer em baldes ou mamadeiras, os quais devem receber toda atenção em relação a limpeza diária.

A utilização de leite de descarte de vacas com mastite ou que receberam antibiótico não é recomendada, pois não é um alimento com bom valor nutritivo, além de não apresentar boa qualidade sanitária.



Concentrado

O concentrado é um alimento muito importante para o desenvolvimento dos bezerros. Deve ser oferecido a partir do terceiro dia de vida, a vontade, em vasilhames limpos e de fácil acesso, até o desaleitamento.

O consumo de concentrado pelos animais aumenta de forma gradativa. Dessa forma, não adianta fornecer grandes quantidades logo nas primeiras semanas de idade. A reposição e a troca do alimento fornecido deve ser feita diariamente.

Concentrados com 18 a 22% de proteína bruta são os mais indicados.

É importante ressaltar que o concentrado utilizado na alimentação dos bezerros é específico, não devendo conter uréia na composição.

Suplemento Mineral


Os concentrados comerciais já possuem todos os macro e microminerais exigidos pelos bezerros. Caso o concentrado seja feito na propriedade, o suplemento mineral específico para bezerros também deve ser colocado a disposição desses animais desde a primeira semana de vida.



Água

A água fresca e limpa deve ser disponibilizada aos bezerros desde o primeiro dia de idade, durante todo o dia.

É muito importante que a água seja fornecida em vasilhames limpos e de fácil acesso. A troca e a reposição da água deve ser realizada diariamente.



Volumoso

Os volumosos para os bezerros devem ser oferecidos somente a partir dos 40 dias de idade. A recomendação para utilização de volumosos para bezerros segue a seguinte ordem de preferência: feno, capim e silagem.

Uma opção interessante é criar os bezerros em casinhas dispostas em piquetes com forrageiras como *tifton*, grama estrela ou outras forrageiras de baixo porte.



Desaleitamento

O preconizado nos programas de aleitamento é que os animais sejam desaleitados aos 60 dias e que tenham dobrado o peso ao nascimento, isso pode ocorrer mais cedo com maior volume de leite oferecido ou mais tarde se houver restrição no volume. Ou seja, se uma bezerra nasceu com 35 kg de peso corporal, quando ela atingir 70 kg, ela está pronta para ser desaleitada.

No momento do desaleitamento é importante que a bezerra esteja consumindo entre 1 a 1,5 kg de concentrado/dia.

O recomendado é que os bezerros sejam mantidos no bezerreiro por pelo menos 10 dias após a retirada do leite, antes de serem transferidos para piquetes com no máximo 10 animais para serem melhor observados. No piquete os bezerros devem continuar recebendo o mesmo concentrado oferecido no bezerreiro.